				Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 80-100 л/дка				
157.	**ХЕЛИКОВЕКС** ЕТ Агробиоконсулт, България Разрешение № 01344 – ПРЗ-1/18.11.2015 г. Заповед №РД 11-1653/06.11.2015 г. Заповед №РД 11-566 от 28.03.2022 г.	*Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (Hear NVP, DSMZ-BV0003)* – 7.5 x 10^{12} вирусни тела/литър	20 мл/дка	**Домати, патладжан, фасул, грах, пъпеш, праз, краставици, тиквички, маруля, тютюн, декоративни култури, царевица, сладка царевица, пресни подправки:** Срещу Памукова нощенка *(Helicoverpa armigera)* - първо третиране –преди излюпване на първите гъсеници Брой мин/макс приложения - макс. 12/ вегетационен период Интервал между приложенията - 8 слънчеви дни, като два частично слънчеви дни се броят за един слънчев ден Да се пръска привечер	П	1 ден	непрофесионална	
158.	**ХИНОДЕ** ИСК Биосайансис Юръп Н.В, Белгия Разрешение № 01756-ПРЗ-2/20.05.2020 г. Заповед №РД 11-1717/20.07.2019 г. Заповед №РД 11-1007 от 18.05.2020 г.	флоникамид 500 г/кг	Продуктът е идентичен на продукта за растителна защита ТЕПЕКИ**,** разрешен за пускане на пазара и употреба с Разрешение № 01440 – ПРЗ, издание 2/07.11.2018 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните.				втора професионална	Със системно действие
159.	**ЦАЙПЕР 10 ЕК** К и Н Ефтимиадис България ЕООД	**Второ търговско име на ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК**						**SPe8 -** Опасен за пчелите
160.	**ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК** К и Н Ефтимиадис България ЕООД	**Второ търговско име на ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК**						**SPe8 -** Опасен за пчелите
161.	**ЦИКЛОН 10 ЕК** СБМ Девелопмънт – Франция Разрешение № 0056-4/29.03.2016 г. Заповед № РД 11-411/16.03.2016 г. Заповед № РД 11-696/19.04.2018 г. Заповед №РД 11-2378/22.11.2018 г. Заповед №РД 11-546 от 15.03.2019 г.	100 г/л циперметрин	25 мл/дка (0,25 л/ха)	**Пшеница, ръж и тритикале:** Срещу листни въшки по листата и класа при житни култури - внася се във фаза по класа BBCH 51 – BBCH 77 през пролетта; срещу листни въшки по листата във фенофаза BBCH 09 – BBCH 21 през есента Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс – 21 Вода л/дка мин/макс - 20-25 л/дка		Житни култури (пшеница, ръж и тритикале) – 21 дни; Рапица – 7 дни; Лозя – 7 дни; Картофи – 7 дни; Ябълки – 14 дни	втора професионална	**SPe8-**Опасен за пчелите
			15 мл/дка (0,15 л/ха	**Рапица** Рапичен цветояд (*Meligeyhes aeneus*) – внася се във фаза листно приложение при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс – 21 Вода л/дка мин/макс - 15 л/дка				
			50 мл/дка (0,50 л/ха)	**Лозя** Лозова листозавивачка – внася се във фаза листно приложение при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс – 2 Вода л/дка мин/макс - 30 л/дка				
			40 мл/дка (0,4 л/ха)	**Лозя** Шарен гроздов молец (*Lobesia botrana*) - внася се във фаза листно приложение при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс – 21 Вода л/дка мин/макс - 30 л/дка				
			20 мл/дка (0,2 л/ха)	**Картофи** Колорадски бръмбар - внася се във фаза листно приложение при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс – 21 Вода л/дка мин/макс - 20 л/дка				
			30 мл/дка (0,3 л/ха)	**Ябълки** Миниращ молец и Ябълков плодов червей *(Cydia pomonella)* - внася се във фаза				

			25-50 пелети/м^3 (=5-10 г PH_3/м^3)	**След прибиране на реколтата - продукти от зърнено-житни култури, изсушени плодове и зеленчуци, варива - фасул, леща, грах, лупина, маслодайни култури на съхранение, ядки, преработени продукти за консумация, сушени подправки, чай, кафе, какао, рожков, сушени билки** Срещу Житна гъгрица (*Sitophilus granarius*), оризова гъгрица (*Sitophilus oryzae*), фасулев зърнояд (*Acanthoscelides obtectus*), грахов зърнояд (*Bruchus pisorum*) царевична гъгрица (*Sitophilus zeamais*), суринамски брашнояд (*Oryzaephilus surinamensis*), малък брашнен бръмбар (*Tribolium confusum*), зърнов бръмбар (ризоперта) (*Rhyzopertha dominica*), ръждивочервен зърнов бръмбар (*Cryptolestes ferrugineus*), трогодерма (*Trogoderma granarium*), зърнов молец (*Sitotroga cerealella*), молец по сушените плодове (*Plodia interpunctella*), сив брашнен молец (*Ephestia kuehniella*), тютюнев бръмбар (*Lasioderma serricorne*), тютюнев молец (*Ephestia elutella*), ръждивочервен брашнен бръмбар (*Tribolium castaneum*), трогодерма (*Trogoderma glabrum*), брашнен бръмбар (*Tenebrio sp.),* брашнян акар (*Acarus siro*), хлебен бръмбар (*Stegobium paniceum*) и *Tyroglyphus sp* – внася се при съхранение Брой мин/макс приложения – 1	3			Между 5-14 дни експози-ция
144.	**ТЕПЕКИ/ АФИНТО** ИСК БИОСАЙЪНС ЮРЪП Н.В., Белгия Разрешение № 01440–ПРЗ-6/19.01.2022 г. Заповед №РД 11-1560/29.08.2016 г. Заповед №РД 11-2082/22.10.2018 г Заповед №РД 11-28 от 03.01.2020 г. Заповед №РД 11-1590 от 12.07.2021 г. Заповед №РД 11-2183 от 21.09.2021 г. Заповед №РД 11-3177 от 31.12.2021 г.	флоникамид 500 г/кг	14 г/дка	**Розови храсти (всички видове култивирани сортове роза: миниатюрни саксийни рози, рози за рязан цвят, рози от разсадник включително коренища):** Листни въшки – внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 3 Вода л/дка мин/макс - в зависимост от обема на храстите	П/О	Хмел-21 дни; Пъпеши, Дини, Тикви , Краставици, Корнишони, Тиквички, Домати, патладжан -1 ден; Пшеница, Тритикале, Лимец – 28 дни; Портокал, Лимон, Грейпфрут, Мандарина, клементина, Лайм – 60; Череша, Слива, Праскова, Кайсия, Нектарина -14 дни; Ябълка, Дюля, Круша, Азиатски круши (Наши) – 21 дни; за останалите – не се изисква	втора професионална	Със системно действие
			14 г/дка	**Всички дървесни видове с мека и твърда дървесина произведени в горски и декоративни разсадници, тополи, върби, насаждения от коледни елхи, семепроизводствени градини, култивирани гори от корков дъб(полско и оранжерийно производство)** Листни въшки – внася се над прага на икономическа вредност Вода л/дка мин/макс - в зависимост от обема на храстите				
			14 г/дка	**Различни видове култури отглеждани за цвят и украсни зелени растения (в саксии и в насаждения, вкл. видовете култури развиващи се от луковици, коренища или декоративни грудки (по врене на вегетативна фаза) (полско и оранжерийно производство)** Листни въшки – внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения - 3 Вода л/дка мин/макс – 15-100 л/дка				
			14 г/дка	**Семепроизводство на култури с дребни семена: зеленчукови и медеицински култури; подправки; цветя, цветни култури; зърнени и бобови култури** Листни въшки – внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 2 Вода л/дка мин/макс – 15-100 л/дка				
			18 г/дка	**Хмел** Листни въшки внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 21 дни Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка				
			14 г/дка	**Тютюн** Листни въшки - внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 2 Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка				
			10 г/дка	**Домати, патладжан** Листни въшки внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 3				

				Интервал между приложенията –14 дни Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка				
			10 г/дка	**Краставици, Корнишони, Тиквички (в оранжерия)** Листни въшки внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията –14 дни Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка				
			10 г/дка	**Пъпеши, Дини, Тикви** Листни въшки - над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията –14 дни Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка				
			14 г/дка	**Пшеница, Тритикале, Лимец** Листни въшки – внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 21 дни Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка				
			10 г/дка	**Портокали, Лимони, Грейпфрут, Мандарини, клементини, Лайм** Листни въшки – внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията –14 дни Вода л/дка мин/макс – 100-300 л/дка				
			14 г/дка	**Череша** Листни въшки - внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията –21 дни Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка				
			14 г/дка	**Праскова, Кайсия, Нектарина** Листни въшки - внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията –21 дни Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка				
			14 г/дка	**Слива** Листни въшки - внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията –21 дни Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка				
			14 г/дка	**Ябълка, Дюля, Круша, Азиатски круши (Наши)** Листни въшки внася се над прага на икономическа вредност Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията –21 дни Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка				

			14 г/дка	**Минимална употреба** **Зелен грах с шушулки Зелен фасул с шушулки** Срещу Зелена грахова листна въшка (*Acyrthosiphon pisum)* Черна бобова листна въшка *(Aphis fabae)* – внася се във фаза BBCH 11-71 (първият същински лист (с прилистници) се разтваря или се развива първото мустаче – 10% от шушулките са достигнали типична дължина) БАБХ не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотокичност при прилагането на ПРЗ ТЕПЕКИ за контрол на зелена грахова листна въшка (*Acyrthosiphon pisum)*) и черна бобова листна въшка *(Aphis fabae)* при зелен грах с шушулки и зелен фасул с шушулки. Отговорността за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотокичност при прилагането на ПРЗ ТЕПЕКИ за контрол на зелена грахова листна въшка (*Acyrthosiphon pisum)* и черна бобова листна въшка *(Aphis fabae)* при зелен грах с шушулки и зелен фасул с шушулки е на лицето, прилагащо продукта	П	14 дни		
145.	**ТРИКА ЕКСПЕРТ** Сипкам Оксон С.П.А., Италия Разрешение № 01302–ПРЗ-3/05.07.2021 г. Заповед № РД 11-247/11.02.2015 г. Заповед № РД 11-1211/ 07.06.2017 г. Заповед №РД 11-1487 от 30.06.2021 г.	ламбда-цихалотрин - 4 г/кг	1000 – 1500 г/дка	**Царевица, сорго, просо** Ларви на нощенки – *Noctuidae (Agrotis spp.),* ларви на бръмбари от сем. *Melolonthidae (Melolontha spp.),* телени червеи - *Elateridae* (*Agriotes spp.)* – внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения - 1	П	-	втора професионална	
			1200 – 1500 г/дка	**Царевица, сорго, просо** Ларви на западен царевичен коренов червей (*Diabrotica virgifera virgifera)* – внася се във фаза BBCH 15-18 (от разтваряне на 5-ти лист до разтваряне на 8-ми лист) Брой мин/макс приложения - 1	П	-		
			1000 – 1500 г/дка	**Памук Слънчоглед Рапица, Соя, Моркови** Ларви на нощенки – *Noctuidae (Agrotis spp.),* ларви на бръмбари от сем. *Melolonthidae* (*Melolontha spp.*), телени червеи - *Elateridae (Agriotes spp.)* – внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения - 1	П	-		
			1000 – 1500 г/дка	**Домати, патладжан, пипер** Ларви на нощенки – *Noctuidae (Agrotis spp.)*, ларви на бръмбари от сем. *Melolonthidae* (*Melolontha spp.*), телени червеи - *Elateridae (Agriotes spp.)* – внася се във фаза BBCH 12 – 16 (от 2-ри същински лист до 6-ти същински лист на главното стъбло) Брой мин/макс приложения - 1	П	-		
			1000 – 1500 г/дка	**Тютюн** Ларви на нощенки – *Noctuidae (Agrotis spp.),* ларви на бръмбари от сем. *Melolonthidae* (*Melolontha spp.),* телени червеи - *Elateridae (Agriotes spp.)* – внася се във фаза BBCH 12 – 14 (Фаза развитие на листата 2 – 4 лист) Брой мин/макс приложения - 1	П	-		
			1000 – 1500 г/дка	**Картофи** Ларви на нощенки – *Noctuidae (Agrotis spp.*), ларви на бръмбари от сем. *Melolonthidae (Melolontha spp*.), телени червеи - *Elateridae (Agriotes spp.)* – внася се във фаза BBCH 00 (Фаза кълнене / пониквване: период на покой) Брой мин/макс приложения - 1	П	-		
			1000 – 1500 г/дка	**Краставици, тиквички, пъпеш, диня,тиква** Ларви на нощенки – *Noctuidae (Agrotis spp.*), ларви на бръмбари от сем. *Melolonthidae (Melolontha spp*.), телени червеи - *Elateridae (Agriotes spp.)* - внася се във фаза BBCH 12 – 14 (от 2-ри същински лист на главното стъбло е напълно разтворен до 4-ти същински лист на главното стъбло е напълно разтворен) Брой мин/макс приложения - 1	П	-		
			1000 – 1500 г/дка	**Марули, салати** Ларви на нощенки – *Noctuidae (Agrotis spp.*), ларви на бръмбари от сем. *Melolonthidae (Melolontha spp*.), телени червеи - *Elateridae (Agriotes spp.)* – внася се във фаза BBCH 12 – 16 (разтворен 2-ри същински лист до фаза разтворен 6-ти	П	-		