

329.	ХОРУС 50 ВГ/ АРНЕТИН 50 ВГ Синджента България ЕООД Разрешение №0606-ПРЗ-4/09.01.2024 г. Заповед №РД 11-1739/29.08.2018 г. Заповед №РД 11-540 от 21.02.2020 г Заповед №РД 11-1598 от 12.07.2021 г. Заповед № РД11-3033/ 22.12.2023 г.	ципродинил 500 г/кг	30-50 г/дка	Ябълки Круши Дюли Срещу Струпяване (<i>Venturia spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 10-79 (фаза “миши уши”: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяне на първите листа – плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 6-10 дни Вода л/дка минмакс – 30-150 л/дка *0,03% - предпазно *0,05% - лечебно със 100 л/дка работен разтвор При спазване забраната за употреба по време на цъфтеж, съгласно Закона за пчеларството		21 дни като послед-ното прило-жение е не по-късно от ВВСН 79	втора професионална
			45-50 г/дка	Праскови Кайсии Нектарини Срещу Кафяво гниене (<i>Monilinia spp.</i>)- внася се във фаза ВВСН 60-79 (първи отворени цветове – плодовете са достигнали около 90% от окончателната си големина) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7-10 дни Вода л/дка минмакс – 30-150 л/дка *0,045% -0,05% със 100 л/дка работен разтвор При спазване забраната за употреба по време на цъфтеж, съгласно Закона за пчеларството		7 дни като послед-ното прило-жение е не по-късно от ВВСН 79	
			45-50 г/дка	Сливи Череши Срещу Кафяво гниене (<i>Monilinia spp.</i>) – внася се във фаза ВВСН 60-85 (първи отворени цветове – зреене на плодовете и семената, оцветяването се развива) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7-10 дни		7 дни като послед-ното прило-жение е не по-късно от ВВСН 85	

				Вода л/дка минмакс – 60-150 л/дка *0,045% -0,05% със 100 л/дка работен разтвор При спазване забраната за употреба по време на цъфтеж, съгласно Закона за пчеларството				
330.	ХОРИЗОНТ Байер България ЕООД	Второ търговско име на ФОЛИКУР 250 ЕВ						
331.	МАКСИМ ЕКСТРА (ЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС) Синджента България ЕООД Разрешение № 01342 – ПРЗ- 2/20.12.2021 г. Заповед №РД 11- 1648/06.11.2015 г. Заповед №РД 11- 1444/25.07.2019 г. Заповед №РД 11-2953 от 09.12.2021 г.	флудиоксонил - 25 г/л дифеноконазол - 25 г/л	150- 200 мл /100 кг семена 200 мл /100 кг семена	Пшеница Хелминтоспориоза (<i>Cochliobolus sativus</i>); Фузариоза (<i>Fusarium</i> spp.); Петносване на плевите (<i>Leptosphaeria nodorum</i>); Твърда (мазна,миризлива) главня (<i>Tilletia caries</i>); Вджуджаваща главня (<i>Tilletia controversa</i>) Снежна плесен (<i>Monographella nivalis</i>); Праховита главня (<i>Ustilago tritici</i>) внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения - 1	3	-	втора професионална	
			150- 200 мл / 100 кг семена 200 мл /100 кг семена	Ечемик Хелминтоспориоза (<i>Helminthosporium</i> spp., <i>Cochliobolus sativus</i>); Фузариоза (<i>Fusarium</i> spp.); Ленточна болест (<i>Pyrenophora graminea</i> = <i>Helminthosporium gramineum</i>) Снежна плесен (<i>Monographella nivalis</i>); Мрежести петна (<i>Pyrenophora teres</i>); Покрита главня (<i>Ustilago hordei</i>) внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения - 1				
			150- 200 мл / 100 кг семена 200 мл /100 кг семена	Овес Фузариоза (<i>Fusarium</i> spp.); Червени петна (<i>Pyrenophora avenae</i>) внася се във фаза BBCH 00 (сухо семе) Хелминтоспориоза (<i>Cochliobolus sativus</i>); Листни петна и петносване на плевите (<i>Septoria</i> spp.); Праховита главня (<i>Ustilago avenae</i>) внася се във				