

62.	ЕСТРЕЛА ВГ/ ЛАМША ВГ/ АДАЛАМ ВГ/ ИНДУЛАМ ВГ Шарда Европа б.в.б.а., Белгия Разрешение № 01303-ПРЗ-3/ 15.09.2016 г. Заповед №РД 11- 1568/ 29.08.2016 г.	ламбда-цихалотрин – 25,6 г/кг	40 – 80 г/дка	Праскови, нектарини Прасковена листна въшка (<i>Myzus persicae</i>) Средиземноморска плодова муха (<i>Ceratitis capitata</i>) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 15 дни Вода л/дка мин/макс – 80-120 л/дка	-	праскови, нектарини, картофи - 7	втора професионална	SPe8 -Опасен за пчелите
			40 – 80 г/дка	Картофи Колорадски бръмбар (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), Листни въшки (<i>Aphis spp.</i>) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 15 дни Вода л/дка мин/макс – 80-120 л/дка				
63.	ЕСТЮОЙЛ Ексклузивас Сарабиа С.А., Испания Разрешение № 01612- ПРЗ-1/13.09.2018 г. Заповед №РД 11- 1740/29.08.2018 г. Заповед №РД 11-3043 от 14.12.2021 г.	парафиново масло (CAS № 8042-47-5) - 790 г/л	0.375 - 1.5 л продукт /дка	Костилкови овощни видове (кайсии, череши, праскови, нектарини и сливи) Срещу Калифорнийска щитоносна въшка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), черинчева щитоносна въшка (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>) – внася се преди ВВСН 53 (отваряне на пъпките: лоспите са отворени, виждат се светложелени сектори) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка	П	-	втора професионална	
			0.375 - 1.5 л продукт /дка	Семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли, китайска круша – Наши) Срещу Калифорнийска щитоносна въшка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) – внася се преди ВВСН 60 (отворени първи цветове) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 50-150 л/дка				
64.	ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК ЦАЙПЕР 10 ЕК/ ЦАЙПЕРСОНИК 10 ЕК К и Н Ефтимиадис България ЕООД Разрешение № 01056- ПРЗ-5/19.01.2022 г. Заповед РД 11- 458/28.03.2014г., Заповед РД 11- 632/09.05.2014г. и Заповед № РД 11- 410/16.03.2016 г. Заповед №РД 11- 334/23.02.2018 г. Заповед РД 11- 1517/31.07.2019 г. Заповед №РД 11-3185 от 31.12.2021 г.	100 г/л циперметрин	25 мл/дка	Пшеница, ръж и тритикале Срещу Листни въшки по листата и класа при житни култури - внася се във фаза ВВСН 51 – ВВСН 77 на пролет; ВВСН 09 – ВВСН 21 на есен Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс- 21 Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка		житни култури (пшеница, ръж и тритикале) – 21 дни; рапица – 7 дни; лозя – 7 дни; картофи – 7; ябълки – 14 дни;	втора професионална	SPe8 - Опасен за пчелите
			15 мл/дка	Рапица Рапичен цветояд (<i>Meligeyhes aeneus</i>) - листно приложение при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс- 21 Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка				
			50 мл/дка	Лозя Листно приложение при поява на неприятеля Лозова листозавивачка				
			40 мл/дка	Шарен гроздов молец (<i>Lobesia botrana</i>) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс- 21 Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка				
			20 мл/дка	Картофи Колорадски бръмбар (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>) листно приложение при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс- 21 Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка				
			30 мл/дка	Ябълки Миниращ молец и Ябълков плодов червей (<i>Cydia pomonella</i>) - листно приложение при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс- 21 Вода л/дка мин/макс-20-25 л/дка				
65.	ИКЕБАНА ТРИПЪЛ АКЦИОН Ротам Агрокемикъл	абаектин 0,015 г/л делтаметрин 0,010 г/л	4,484 л продукт/ дка	Декоративни растения (тревисти и дървесни растения) Срещу Листни въшки, гъсеници, акари Брашнеста мана Ръжди – внася се във всяка една фаза на развитие на културата	3	-	непрофесионална	С комбинирано действие -