

				листно приложение при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс – 21 Вода л/дка мин/макс – 20 л/дка				
162.	ЦИКЛОН 100 ЕВ СБМ Девелопмънт, Франция	Второ търговско име на ШЕРПА 100 ЕВ						SPe8 - Опасен за пчели
163.	ЦИПЕРФОР 100 ЕК СБМ Девелопмънт, Франция Удостоверение № 1201-ПРЗ-1/02.12.2013 г. Заповед № РД 11-1173/05.11.2013г. Заповед № РД 11-1243/19.11.2013 г.	100 г/л циперметрин	25 мл/дка (0,25 л/ха) 15 мл/дка (0,15 л/ха) 50 мл/дка (0,50 л/ха) 40 мл/дка (0,4 л/ха) 20 мл/дка (0,2 л/ха) 30 мл/дка (0,3 л/ха)	Пшеница, ръж и тритикале Срещу листни въшки по листата и класа при житни култури Рапица Рапичен цветояд Лозя Лозова листозавивачка Шарен гроздов молец (<i>Lobesia botrana</i>) Картофи Колорадски бръмбар (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>) Ябълки Миниращ молец и Ябълков плодов червей (<i>Cydia pomonella</i>)		Житни култури (пшеница, ръж и тритикале) – 21 дни; Рапица – 7 дни; Лозя – 7 дни; Картофи – 7 дни; Ябълки – 14 дни	2	SPe8 - Опасен за пчели
164.	ЦИПЕРФОР 100 ЕВ СБМ Девелопмънт, Франция	Второ търговско име на ШЕРПА 100 ЕВ						
165.	ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл, Белгия	Второ търговско име на ЦИТРИН МАКС						
166.	ЦИПЕРТ 500 ЕК Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл, Белгия	Второ търговско име на ЦИТРИН МАКС						
167.	ЦИТРИН МАКС ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК ЦИПЕРТ 500 ЕК ПОЛИ 500 ЕК Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл, Белгия Удостоверение № № 01176-ПРЗ-2/20.03.2014 г. Заповед № РД 11-178/18.02.2013 г. Заповед № РД 11-304/10.03.2014 г. Заповед №РД 11-348 от 02.03.2022 г. Заповед №РД 11-1014/04.05.2023	500 г/л циперметрин	5 мл/дка	Житни -Листни въшки по житни (<i>Sitobion avenae</i>), житни листозавивачки (<i>Cnephasia spp</i>) и Листни въшки (<i>Metopolophium dirhodum</i>); Рапица Рапична стъблена бълха (<i>Psylloides chrysocephala</i>), Рапичен скритохоботник (<i>Ceuthorrhynchus assimilis</i>), Рапичен цветояд (<i>Meligeyhes aeneus</i>), Рапична листна оса (<i>Anthalia rosae</i>), Рапичен стъблен скритохоботник (<i>Ceuthorrhynchus napi</i>) и зелен стъблен скритохоботник (<i>Ceuthorrhynchus quadridens</i>); Лен Синя ленова бълха (<i>Aphthona euphorbiae</i>), Ленова бълха (<i>Longitarsus parvulus</i>) и Кръгломиниращ молец (<i>Leucoptera malifoliella</i>); Лозя Филлоксера (<i>Phylloxera vastatrix</i>); Зеле Бяла зелена пеперуда (<i>Pieris brassicae</i>) Фасул Листни въшки (<i>Aphididae spp.</i>) Леща Грахова листозавивачка (<i>Cydia nigricana</i>) и зърнояди (<i>Bruchinae</i>) Листни въшки (<i>Aphididae spp.</i>) Грах Хоботници (<i>Curculionidae</i>), Листни въшки (<i>Aphididae spp.</i>), Грахова листозавивачка (<i>Cydia nigricana</i>), Зърнояди (<i>Bruchinae</i>) и Гамозначна нощенка (<i>Autographa gamma</i>) Пролетен грах Грахова листозавивачка (<i>Cydia nigricana</i>), Хоботници (<i>Curculionidae</i>) и листни въшки; Бакла Листни въшки (<i>Aphididae spp.</i>), Зърнояди (<i>Bruchinae</i>) и Хоботници (<i>Curculionidae</i>);	-	3-домати; 7-зеле картофи, праз, лук и чесън; 14-грах и бакла; 21-грозде; 28-зърнено-житни; 49-рапица и лен; царевича – не се изисква	2	SPe8 - Опасен за пчели

				Лук и чесън Трипс (<i>Thrips tabaci</i>) Праз Молец по прازа (<i>Acrolepia assectella</i>), Трипс (<i>Thrips tabaci</i>) Картофи Колорадски бръмбар (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>) Ряпа Репна пеперуда (<i>Pieris rapae</i>)				
			6 мл/дка	Лозя Лозова цикада (<i>Empoasca vitis</i>), Еднопоясен гроздов молец (<i>Eupoecilia ambiguella</i>), Шарен гроздов молец (<i>Lobesia botrana</i>) и Малка лозова листозавивачка (<i>Argyrotaenia pulchellana</i>);				
			10 мл/дка	Домати Памукова ношенка (<i>Heliothis armigera</i>), Картофен молец (<i>Phthorimaea operculella</i>), Бели пеперуди (<i>Pieris spp.</i>), Зелени молци (<i>Plutella spp.</i>), Зелени ношенки (<i>Mamestra spp.</i>), Гамозначна ношенка (<i>Autographa gamma</i>) и Зимен сив червей (<i>Agrotis segetum</i>);				
			10 мл/дка	Декоративни рози Листни въшки				
			15 мл/дка	Царевица Царевичен стъблен пробивач (<i>Ostrinia nubilalis</i>) и <i>Sesamia nonagrioides</i>				
168.	ШЕРПА 100 ЕВ /АФИКАР 100 /ЦИПЕРФОР 100 ЕВ /ЦИКЛОН 100 ЕВ СБМ Девелопмънт, Франция Разрешение № 01347–ПРЗ-2/ 08.01.2016 г. Заповед №РД 11-1650/ 06.11.2015г Заповед № РД 11-1941/30.12.2015 г. Заповед № РД 11-699/19.04.2018 г. Заповед №РД 11-2379/22.11.2018 г. Заповед №РД 11-624 от 05.03.2020 г. Заповед №РД 11-1599 от 12.07.2021 г.	циперметрин - 100 г/л	25 мл/дка	Пшеница, ръж, тритикале Листни въшки по класа (<i>Sitobion avenae</i>) – внася се във фаза ВВСН 10 – 69 (Първи лист от колеоптила – края на цъфтеж) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс - 21 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л /дка		Пшеница, ръж, тритикале – 21 дни; Рапица – 28 дни; Ябълкаи, круши, Картофи – 14 дни; Царевица, сладка царевица, сорго, грах, рапица, пшеница, ръж, тритикале, овес, ечемик, слънчоглед, лозя – 7 дни;	втора професионална	SPe8 -Опасен за пчелите
			20 мл/дка	Пшеница, ръж, тритикале Листни въшки по листата (<i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Metopolophium dirhodum</i>) – внася се във фаза ВВСН 12 – 29 (Втория лист - край на братенето) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс - 21 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л /дка				
			15 мл/дка	Рапица Рапичен цветояд (<i>Meligethes aeneus</i>) – внася се При поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс - 21 Вода л/дка мин/макс – 30-50 л /дка				
			25 мл/дка	Рапица Рапична стъблена бълха (<i>Psylliodes chrysocephala</i>) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс - 21 Вода л/дка мин/макс – 30-50 л /дка				
			25 мл/дка	Рапица Рапичен скритохоботник (<i>Ceutorhynchus assimilis</i>) внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс - 21 Вода л/дка мин/макс – 30-50 л /дка				
			20 мл/дка	Картофи Колорадски бръмбар (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)- внася се ВВСН 09 – 6N9* (Поникване – края на цъфтеж) при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс - 21 Вода л/дка мин/макс – 50-100 л /дка				
			30 мл/дка	Ябълки Листоминиращи молци (<i>Stigmella malella</i> , <i>Lyonetia clerkella</i>) внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100 л /дка				