

				21 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			100 мл продукт /дка	Тритикале Срещу Фузариози (<i>Fusarium sp.</i>) – внося се във фаза ВВСН 30-65 Начало на удължаване на стъблото – пълен цъфтеж Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 14- 21 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	35 дни		
337.	ШАМПИОН ВП /МАКК 50 ВП /ШАМП ВП НюФарм С.А.С.-Франция Удостоверение № 01048-ПРЗ-2/ 19.10.2015 г. Заповед № РД 12- 27/14.03.2003 г. Заповед №РД 11- 1519/02.10.2015 г. Заповед №РД 11-708 от 17.03.2020 г.	77 % меден хидроокис (50 % Cu)	0,15 %	Лоза Мана по лоза (<i>Plasmopara viticola</i>)		14 дни	3	
			0,15 %	Домати Мана по домати (<i>Phytophthora infestans</i>)				
			0,15 %	Пъпеши Мана по пъпеши (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)				
			0,15 %	Краставици (полско производство) Мана по краставици (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)				
			0,3 %	Ябълка Струпясване по ябълка (до фаза миши уши) (<i>Venturia inaequalis</i>)				
			0,3 %	Праскова Къдравост по праскова (<i>Taphrina deformans</i>)				
			150 г/дка	Картофи Мана по картофи (<i>Phytophthora infestans</i>)				
			300 г/дка	Захарно цвекло Церкоспороза по захарно цвекло (<i>Cercospora beticola</i>) в				
			300 г/дка	Минимална употреба Круша Срещу Струпясване (<i>Venturia pirina</i>) фаза на приложение: ВВСН 97-10 (след прибиране на продукцията, във фаза „всички окапали листа - фаза „миши уши”);				
				Минимална употреба				

			300 г/дка	Кайсия Сачмянка (<i>Stigmina carpophila</i>), Ранно кафяво гниене фаза на приложение: ВВСН 97-03 (всички листа са паднали – край на събуждането (набъбването) на пъпките)				
			300 г/дка	Минимална употреба Череша Сачмянка (<i>Stigmina carpophila</i>) Ранно кафяво гниене (<i>Monilina laxa</i>) фаза на приложение: ВВСН 97-03 (всички листа са паднали – край на събуждането (набъбването) на пъпките)				
			300 г/дка	Минимална употреба Слива Сачмянка (<i>Stigmina carpophila</i>) Ранно кафяво гниене (<i>Monilina laxa</i>) фаза на приложение: ВВСН 97-03 (всички листа са паднали – край на събуждането (набъбването) на пъпките)				
			150-300 г продукт/дка	Минимална употреба Роза Срещу Ръжда по розата- (<i>Phragmidium microspora-tum L.</i>) Черни листни петна – <i>Diplocarpon rose</i> Wolf) – внася се от навлизане в зимен покой до начало на набъбване на пъпките Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка Да не се прилага повече от 400 г а.в. мед /дка/година Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита ШАМПИОН ВП / МАКК 50 ВП / ШАМП ВП при минимални употреби. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проява на фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита ШАМПИОН ВП / МАКК 50 ВП / ШАМП ВП				

			при минимални употреби е на лицето, прилагашо продукта.				
338.	ДИШОН 25 ЕК Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия	Второ търговско име на ШАРДИФ 25 ЕК					