								министъра на околната среда и водите.
360.	**ШАДОУ** Ариста ЛайфСайънс С.А.С., Франция Разрешение №01635-ПРЗ-1/07.11.2018 г. Заповед №РД 11-2063/19.10.2018 г. Заповед №РД 11-972 от 17.05.2022 г.	клетодим – 120 г/л	Продуктът е идентичен на ПРЗ СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК с Разрешение № 0348-ПРЗ-4/25.07.2018 г за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита				втора професионална	със системно действие
361.	**ШАРНИК** Шарда Кропкем Испания С.Л. Разрешение №01788-ПРЗ-2/17.05.2023 г. Заповед № РД 11-2631/17.12.2019 г. Заповед № РД11-1035/04.05.2023 г.	никосулфурон - 40 г/л	125 – 150 мл продукт /дка	**Царевица** Срещу едногодишни житни плевели и някои широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист –разтваряне на осми лист) на царевицата Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
362.	**ШАРПЕН 33 ЕК ПЕНДИ 33 ЕК/ ПЕНКОТ 33 ЕК** ШАРДА ЕВРОПА Б.В.Б.А., Белгия Разрешение №01279 – ПРЗ-3/14.02.2017г. Заповед № РД 11-1981/10.12.2014 г., Заповед №.РД 11-193/03.02.2015 г., Заповед №РД 11-1661/06.11.2015 г. и Заповед № РД 11-87/16.01.2017 г	пендиметалин - 330 г/л		Едногодишни житни и широколистни плевели		Аспержи - 28 дни; Марули, Ендивия, Цикория – 75дни; Слънчоглед, царевица, Фасул, Соя, Грах (за консервиране), Нахут, Моркови, Ряпа, Картофи, Тютюн, Пипер, Карфиол, Козя брада, Лупина, Памук,	Втора професионална	
			360-600 мл/дка	**Слънчоглед** Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)				
			360-600 мл/дка	**Царевица** Внася се лед сеитба, преди поникване (ССПП)				
			360-600 мл/дка	**Фасул** Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)				
			300-600 мл/дка	**Соя** Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)				
			360-600 мл/дка	**Грах (за консервиране), нахут –** Внася се се след сеитба, преди поникване (ССПП)				
			300-600 мл/дка	**Моркови, ряпа** Внася се се след сеитба, преди поникване (ССПП)				
			400-600 мл/дка	**Аспержи** Внася се период на покой				

			360-600 мл/дка	**Картофи** Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)		Топола, Лоза (винени и десертни сортове), Ябълки, круши, Кайсии, праскови,нектарини, Овощни разсадници, Цитрусови култури (портокали, лайм, мандарини, грейпфрут, помело), Фъстъци, Декоративни растения и разсадници, Треви за семена(AGSTE, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FESSS, AGSST - Ограничен от фазата на приложение		
			360-600 мл/дка	**Тютюн** Внася се преди разсаждане				
			400-600 мл/дка	**Пипер** Внася се ССПП или преди разсаждане				
			300-600 мл/дка	**Марули** Внася се ССПП или преди разсаждане				
			300-600 мл/дка	**Ендивия** Внася се ССПП или преди разсаждане				
			300-600 мл/дка	**Карфиол** Внася се преди разсаждане				
			300-500 мл/дка	**Цикория –** Внася се преди разсаждане				
			240 мл/дка	**Козя брада** Внася се ССПП				
			360 мл/дка	**Лупина** Внася се ССПП				
			400-600 мл/дка	**Памук** Внася се ССПП или преди разсаждане				
			280-360 мл/дка	**Топола** Внася се след разсаждане				
			400-600 мл/дка	**Лозя (винени и десертни сортове)** Внася се в периода на зимен покой				
			400-600 мл/дка	**Ябълки, круши,** дюли Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза				
			400-600 мл/дка	**Кайсии, праскови, нектарини** Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза				
			400-600 мл/дка	**Овощни разсадници** Внася се преди или след разсаждане				
			400-600 мл/дка	**Цитрусови култури (портокали, лайм, мандарини, грейпфрут, помело)** Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза				
			400-600 мл/дка	**Фъстъци** Внася се ССПП				
			300-730 мл/дка	**Декоративни растения и разсадници** Внася се преди или след разсаждане				

			210-400 мл/дка	**Треви за семена (AGSTE, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FFESSS, AGSST)** Внася се след поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение)				
363.	**ШОГУН 100 ЕК** Адама Агрикалчър Б.В., Нидерландия	**Второ търговско име на АЖИЛ 100 ЕК**						
364.	**ЯСТРЕБ ПЛЮС** Монсанто Европа С.А./Н.В Разрешение № 01511-ПРЗ-Издание:2/17.11.2023 г. Заповед № РД 11-2120/19.10.2017 г. Заповед № РД11-2652/08.11.2023 г.	глифозат 360 г/л	300 мл/дка	**Царевица** Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – внася се преди сеитбата на културата (плевели в активен растеж) Интервал между приложенията - 1 Вода л/дка – 10-20 л /дка	-	30 дни	непрофесионална	Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни или учебни заведения. Да не се прилага този продукт в зони за защита, определени в
			400-1200 мл/дка	**Овощни градини, стърнища** Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – прилага се по време на Бутонизация на широколистните и изкласяване/ изметляване на житните плевели (плевели в активен растеж) Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка - 15-20 л /дка		-		
			400-600 мл/дка	**Стърнища** Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – прилага се по време на бутонизация на широколистните и изкласяване/ изметляване на житните плевели (плевели в активен растеж) Брой мин/макс приложения - 1 Вода л/дка - 15-20 л /дка				
			1200 мл/дка	**Железопътни линии** Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – внася се по време на Бутонизация на широколистните и изкласяване/ изметляване на житните плевели (плевели в активен растеж) Брой мин/макс приложения – 1		-		