

			100 мл/дка	Брюкселско зеле Черни листни петна (<i>Alternaria brassicae</i> , <i>A. brassicicola</i>) – внася се във фаза ВВСН 20-49 (10 или повече разтворени същински листа-достигнат е типичния размер на главата)		14 дни		
			100 мл/дка	Маслодайни култури от сем. Кръстоцветни (рапица,мак,синап, камелина – див лен) Склеротиниоза (бяло гниене) (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), Гъбни заболявания по шушулките (<i>Alternaria brassicae</i>) – внася се във фаза ВВСН 00-71 (сухо семе-10% от шушулките са оформени)		21 дни		
			80 мл/дка	Пъпеш Мана (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), брашнеста мана (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>), алтернариоза (<i>Alternaria cucumerina</i>) – внася се във фаза ВВСН 20-89 (20 листа напълно разтворени-пълна зрялост (плодовете са с типичен цвят)		3 дни		
			100 мл/дка	Семепроизвеждащи растения (стерично-маслени, ароматни, лекарствени култури и подправки), цветя и посадъчен материал, *Трет.надз.части Болести по листата (мана, брашнеста мана,ръжда, бяла ръжда) – внася се във фаза ВВСН 20-89		-		
3.	АЗОГАРД АЗТ 250 СК Синджента България ЕООД Разрешение № 01592-ПРЗ-2/19.03.2021 г. Заповед №РД 11-1045/19.06.2018 г. Заповед №РД 11-500 от 11.03.2021 г.	азоксистробин - 250 г/л	60-80 мл/дка	Пшеница Срецу Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>) Ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>) - внася се във ВВСН 30-69 (Начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка	П	35 дни	непрофесионална	Да се спазва закона за пчеларството

			80 мл/дка	Ечемик Срещу Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-59 (Начало на удължаване на стъблото-край на изкласяването) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка		35 дни		
			80-100 мл продукт/ дка	Маслодайна рапица Срещу Бяло гниене (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) – внася се във фаза ВВСН 60-69 (10% от цветовете на главния цветонос отворени, нарастване на главния цветонос-край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка		21 дни		
Продуктът е идентичен на ПРЗ АМИСТАР 25 СК с Разрешение № 01262-ПРЗ-Издание: 3/02.12.2020 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита.								
4.	АКОИДАЛ ВГ АгроБиоТрейдинг ООД - България Удостоверение № 0387/18.04.2006 г. Заповед РД 09-232/13.04.2006 г.	80 % сяра	0,25 %	Оидиум по лоза (<i>Oidium tuckeri</i> , <i>Uncinula necator</i>)		20 дни	непрофесионална	
5.	АКТЛЕТ Ф АСЦЕНЗА АГРО С.А., Португалия Разрешение № 01869-ПРЗ-1/19.08.2020 г. Заповед №РД 11-1817 от 07.08.2020 г. Заповед №РД 11-1887 от 17.08.2020 г.	металаксил-М - 50 г/кг фолпет - 400 г/кг	200 г продукт/ дка	Лозя (винени сортове) Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – внася се във фаза ВВСН 18-85 (9 и повече листа са отворени - омекване на зърната) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 12-14 дни Вода л/дка мин/макс – 10-100 л/дка Да не се консумират лозови листа от третираните с продукта лози	П	28 дни	втора професионална	
			200 г продукт/ дка	Лозя (десертни сортове) Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – внася се във фаза ВВСН 18-69 (9 и повече листа са отворени – край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 1-2	П	-		