

|     |  |  |              |   |   |                                   |                        |
|-----|--|--|--------------|---|---|-----------------------------------|------------------------|
| 13. | <b>АМИСТАР 25 СК</b><br>Синджента България ЕООД<br>Разрешение № 01262–ПРЗ-3/02.12.2020 г.<br>Заповед РД 11-1269 от 01.08.2014 г.<br>Заповед РД 11-683 от 21.04.2015 г.<br>Заповед №РД 11-2606 от 23.11.2020 г. | 250 г/л<br><a href="#">азоксистробин</a>   | 60-80 мл/дка | <b>Пшеница</b><br>Брашнеста мана ( <i>Erysiphe graminis</i> ),<br>Ран листен пригор ( <i>Septoria tritici</i> ),<br>Кафява ръжда ( <i>Puccinia recondita</i> )<br>Брой мин/макс приложения – 2<br>Интервал между приложенията – 14 дни<br>Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка   | П | 35 дни                            | непрофесионална        |
|     |  |  | 80 мл/дка    | <b>Ечемик</b><br>Брашнеста мана ( <i>Erysiphe graminis</i> ) -<br>ВВСН 30-59<br>(Начало на удължаване на стъблото-<br>край на изкласяването)<br>Брой мин/макс приложения – 1<br>Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка   | П | 35 дни                            |                        |
|     |  |  | 80 мл/дка    | <b>Маслодайна рапица</b><br>Бяло гниене Бяло гниене<br>(склеротиния) ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ) – внася се във фаза<br>ВВСН 60-69<br>(10% от цветовете на главния<br>цветонос отворени, нарастване на<br>главния цветонос-край на цъфтежа)<br>Брой мин/макс приложения – 1<br>Вода л/дка мин/макс – 20-50 л/дка  | П | 21 дни                            |                        |
| 14. | <b>АМИСТАР ГОЛД</b><br>Синджента България ЕООД<br>Разрешение № 01426 – ПРЗ-<br>2/04.12.2019 г.<br>Заповед №РД 11-<br>949/31.05.2016 г.<br>Заповед №РД 11-2405 от<br>26.11.2019 г.                              | <a href="#">азоксистробин</a> -<br>125 г/л<br><a href="#">дифеноконазол</a> -<br>125 г/л | 100 мл/дка   | <b>Зимна маслодайна рапица</b><br>Сухо стъблено гниене ( <i>Leptosphaeria macularia</i> ), Склеротинийно гниене<br>( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ) – внася се<br>във фаза Есенно третиране ВВСН 14<br>Разтворен четвърти лист Пролетно<br>третиране – до<br>ВВСН 65-69 Край на цъфтежа<br>Брой мин/макс приложения – 2<br>Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка | П | Слънчоглед – 60,<br>Рапица - няма | втора<br>професионална |
|     |  |  | 100 мл/дка   | <b>Пролетна рапица</b><br>Склеротинийно гниене ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ) – внася се във фаза<br>ВВСН 63-69 От 40% от цветовете на<br>главния цветонос са разтворени до<br>край на цъфтежа<br>Брой мин/макс приложения – 1   |   |                                   |                        |

|     |  |   |                  |  |    |   |                     |  |
|-----|--|---|------------------|--|----|---|---------------------|--|
|     |  |   |                  | Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка  |    |   |                     |  |
|     |  |   | 100 мл/дка       | <b>Слънчоглед</b><br>Склеротинийно гниене ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ), Фомоза (черни петна) ( <i>Phoma macdonaldii</i> ), Фомопсис (сиви петна) ( <i>Diaporthe helianthi</i> ) ВВСН 20-55 От 10 разтворени листа до фаза бутонът е отделен от най-горните листа<br>Брой мин/макс приложения – 2<br>Интервал между приложенията – 21 дни<br>Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка   |    |   |                     |  |
| 15. | <b>АРХИТЕКТ</b><br>БАСФ СЕ, Германия<br>Разрешение № 01994-ПРЗ-1/20.12.2021 г.<br>Заповед №РД 11-2963 от 09.12.2021 г. | <a href="#">пираклостробин</a><br>– 100 г/л<br><br><a href="#">мепикват-хлорид</a><br>– 150 г/л<br><br><a href="#">прохексадион-калций</a> – 25 г/л | 120 – 200 мл/дка | <b>Зимна маслодайна рапица</b><br>Срещу Фомоза ( <i>Plenodomus lingam</i> ( <i>Leptosphaeria maculans</i> )), Листни петна (цилиндроспо-роза) ( <i>Pyrenopeziza brassicae</i> Повишаване устойчивостта срещу полягане I <sup>во</sup> третиране наесен ВВСН 15-20 (разтворен пети лист - няма странични разклонения)<br><br>II <sup>ро</sup> третиране напролет ВВСН 21-59 (начало на формиране на страничните разклонения - видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени (“жълт бутон”))<br><br>Брой мин/макс приложения – 2<br>Интервал между приложенията - период на зимен покой на културата<br>Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка | II | - | втора професионална | с комбинирано (системно и несистемно) действие |
|     |  |   | 100 мл/дка       | <b>Зимна маслодайна рапица</b><br>Срещу Фомоза ( <i>Plenodomus lingam</i> ( <i>Leptosphaeria maculans</i> )), Листни петна (цилиндроспо-роза) ( <i>Pyrenopeziza brassicae</i> Повишаване устойчивостта срещу полягане – внася се наесен ВВСН 15-20 (разтворен пети лист - няма странични разклонения)<br>Брой мин/макс приложения – 2<br>Интервал между приложенията – 14  | II |   |                     |  |