

				Вода л/дка мин/макс - На полето 30 - 80 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка				
			8-12 г/дка	Краставици, пъпешни, дини, тикви (полско и оранжерийно производство): На полето: ВВСН 71 – 89 Трети плод – пълна зрялост В оранжерии: ВВСН 15-89 Пети същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост Гамозначна ношенка (<i>Autographa gamma</i>), памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), малка полска ношенка (<i>Spodoptera exigua</i>), египетска памукова ношенка (<i>Spodoptera litoralis</i>), царевичен стъблен пробивач (<i>Ostrinia nubilalis</i>) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс- На полето 30-120 л/дка В оранжерии 30-150 л/дка	П/О	3 дни		
			8-12 г/дка	Марули (полско и оранжерийно производство): Марули предназначени за храна ВВСН 12-49 – разтворен втори същински лист – типичен размер, форма и твърдост на главите Марули, предназначени за семепроизводство ВВСН 12-89 разтворен втори същински лист – пълно узряване Малка полска ношенка (<i>Spodoptera exigua</i>), египетска памукова ношенка (<i>Spodoptera litoralis</i>), памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), гамозначна ношенка (<i>Autographa gamma</i>) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс- 30-80 л/дка	П/О	3 дни		
			8 – 12 г/дка	Спанак, салатни растения (полско производство): предназначени за храна ВВСН 12-49 – разтворен втори същински лист формирана цялата листна маса предназначени за семепроизводство ВВСН 12-89 разтворен втори същински лист - пълно узряване Малка полска ношенка (<i>Spodoptera exigua</i>), египетска памукова ношенка (<i>Spodoptera litoralis</i>), памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), гамозначна ношенка (<i>Autographa gamma</i>) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс- 30-80 л/дка		3 дни		
			8 – 12 г/дка	Подправки (полско производство): предназначени за храна ВВСН 12-49 предназначени за семепроизводство ВВСН 12-89 Малка полска ношенка (<i>Spodoptera exigua</i>), египетска памукова ношенка (<i>Spodoptera litoralis</i>), памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), гамозначна ношенка (<i>Autographa gamma</i>) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс- 30-80 л/дка		3 дни		
10.	АМПЛИГО 150 ЗК Синджента България ЕООД Разрешение № 1270-ПРЗ-3/30.06.2023 г. Заповед №РД. 11-2280/12.11.2018 г. Заповед №РД РД11-1354/07.06.2023 г.	50 г/л <u>дамбда-</u> <u>цихалотрин</u> <u>хлорантранили</u> <u>прод</u> 100 г/л	20 мл продукт/ дка	Домати Срещу Надземни ношенки (<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera</i> spp.) Листни въшки: черна бобова листна въшка (<i>Aphis fabae</i>), памукова листна въшка (<i>Aphis gossypii</i>), зеленовичеста листна въшка (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), зелена прасковена листна въшка (<i>Muzus persicae</i>) - внася се във фаза ВВСН 51-61 (първо съцветие изправена пъпка-първо съцветие: първи разцъфнал цвят) или ВВСН 71-89 (първа китка: първи плод с типичен размер-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка	П	3 дни	втора професионална	SPe8 -Опасен за пчелите.

			<p>30 мл продукт/ дка</p> <p>Сладка царевича Срещу Царевичен стъблопробивач (<i>Ostrinia nubilalis</i>), Средиземноморски царевичен стъблопробивач (<i>Sesamia nonagrioides</i>), Памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), Западен царевичен коренов червей (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>) – внася се във фаза ВВСН 14-79 (разтваряне на 4-ти лист-почти всички зърна са достигнали окончателния си размер) При яйцеснасяне до начало на излюпване на неприятеля Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/дка</p>	П	14 дни		
		<p>30 мл продукт/ дка</p> <p>Царевича Срещу Царевичен стъблопробивач (<i>Ostrinia nubilalis</i>) Средиземноморски царевичен стъблопробивач (<i>Sesamia nonagrioides</i>) Памукова ношенка (<i>Helicoverpa armigera</i>), Западен царевичен коренов червей (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>) – внася се във фаза ВВСН 34-77 Поява (на четвърти възел - съдържание на 60% сухо млекоподобно вещество в зърната от средната част на кочана) При яйцеснасяне до начало на излюпване на неприятеля Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/дка</p>					
		<p>25 мл продукт/ дка</p> <p>Картофи Срещу Картофен молец (<i>Phthorimaea operculella</i>) – внася се във фаза до ВВСН 60 (до първи отворен цвят) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 30 – 80 л/дка</p>	14 дни				
		<p>20 мл продукт/ дка</p> <p>Артишок Срещу Надземни ношенки: малка полска ношенка (<i>Spodoptera exigua</i>), египетска памукова ношенка (<i>Spodoptera littoralis</i>), сребристоточкова ношенка (<i>Chrysodeixis chalcites</i>) Листни въшки (<i>Brachycaudus cardui</i>, <i>Brachycaudus persicae</i>, <i>Macrosiphum</i> spp.) – внася се във фаза ВВСН 12-49 (разтворен втори същински лист - достигната 90% от листната маса на растението) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка</p>	3 дни				

11.	АПАЧИ ЕВ Индустиас Афраза, С.А., Испания Разрешение № 01741-ПРЗ- 3/24.08.2023 г. Заповед №РД 11-1634/08.08.2019 г Заповед №РД 11-3045 от 22.12.2020 г. Заповед № РД 11- 1873/08.08.2023 г.	<u>абамектин</u> - 18 г/л	30-100 мл продукт/дка	Домати, патладжан Срещу Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>), Листоминиращи мухи (<i>Liriomyza</i> spp.) – внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията - 7 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка Да се прилага от март до октомври	О	3 дни	втора професионална	С несистемно действие Spe8 - Опасен за пчелите. Затворете плътно оранжерията за предотвратяване на случайно влетяване на пчели в нея. Да не се използва през месеците ноември- февруари
			50-100 мл продукт/ дка	Пъпеш, дини Срещу Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>) Листоминиращи мухи (<i>Liriomyza</i> spp.) – внася се при нападение (не по-късно от ВВСН 89-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията - 7 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка Да се прилага от март до октомври	О	3 дни		