

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------|--|--|---|-------|------------------------|--|
| 23. | БЕРМЕКТИН Пробелте С.А.Ю., Испания Разрешение № 01622-ПРЗ-2/24.08.2023 г. Заповед №РД 11-1744/29.08.2018 г. Заповед №РД 11-1024 от 20.05.2020 г. Заповед № РД 11-1877/08.08.2023 г | абамектин - 18 г/л | 15-100 (50-100 мл/100 л вода) | Домати Срещу Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>), <i>Polyphagotarsonemus latus</i> , домотов акар (<i>Aculops lycopersici</i>), листоминиращи мухи (<i>Liomyza</i> spp.) – внася се при нападение Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка | О | 3 дни | Втора професионална | Забележка: За приложение в оранжерии да не се използва 4 дни преди навлизане на насекоми и 14 дни преди навлизане на опрашващи насекоми. с несистемно действие Spe8 - Опасен за пчелите. Затворете плътно оранжерията за предотвратяване на случайно влетяване на пчели в нея. Да не се използва през месеците ноември-февруари |
|-----|---|-----------------------|--|--|---|-------|------------------------|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|--|---|---|--|---------------------|---------------------------------|
| | | | 15-100 (50-100 мл/100 л вода) | Домати Срещу <i>Tuta absoluta</i> – внася се при нападение Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка | О | 3 дни | | |
| | | | 15-80 (50-80 мл/100 л вода) | Патладжан Срещу Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>) – внася се при нападение Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка В оранжерии да не се прилага през зимата: от ноември до февруари | О | 3 дни | | |
| | | | 15-100 (50-100 мл/100 л вода) | Тиквови с неядлива кора (пъпеш, диня, тиква) Срещу Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>), листоминиращи мухи (<i>Liomyza trifolii</i>) – внася се при нападение Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка В оранжерии да не се прилага през зимата: от ноември до февруари | О | 3; | | |
| | | | 15-100 (50-100 мл/100 л вода) | Тиквови с ядлива кора (краставици, корнишонни, тивички) Срещу Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>), листоминиращи мухи (<i>Liomyza trifolii</i>) – внася се при нападение Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка В оранжерии да не се прилага през зимата: от ноември до февруари | О | 3 дни | | |
| | | | 15-100 (50-100 мл/100 л вода) | Ягоди Срещу Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>), листоминиращи мухи (<i>Liomyza trifolii</i>), ягодов акар (<i>Phytonemus pallidus</i>) – внася се при нападение Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка В оранжерии да не се прилага през зимата: от ноември до февруари | О | 3 дни | | |
| | | | 15-100 (50-100 мл/100 л вода) | Цветни и декоративни растения Срещу Обикновен паяжинообразуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>) - внася се при нападение Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 15 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка | О | - | | |
| 24. | БРАИ Лаинко С.А., Испания Разрешение № 01381–ПР3-2/ 07.06.2016 г. Заповед № РД 11-407/16.03.2016 г. Заповед №РД 11-848/19.05.2016 г. Заповед №РД 11-44 от 06.01.2020 г. | <u>пирпроксифе</u> н – 100 г/л | 50-112,5 мл/дка | Портокали, мандарини, лимони: Щитоносни въшки – (<i>Aonidiella aurantii</i> , <i>Aspidiotus nerii</i> , <i>Saissetia oleae</i>) – внася се във фаза ВВСН 71-74 Разрастване на яйчника; окапване на завръзи след цъфтежа – Плодовете достигат 40% от нормалната големина. Край на физиологичното окапване на тъмнозелените плодове Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка За да се избегне поява на резистентност – да не се извършва повече от 1 третиране за вегетационен период. Да не се надвишава дозата от 112,5 мл продукт/дка | П | Портокали, мандарини, лимони – 30 дни; Домати – 3 дни; Ябълки, круши, Праскови, кайсии, сливи, черши – не се изисква | втора професионална | SPe8 – Опасен за пчелите |
| | | | 28-50 мл/дка | Ябълки и круши: Калифорнийска щитоносна въшка (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) – внася се във фаза ВВСН 54-72 Фаза „Миши уши“: зелените листни връхчета са 10 мм над люспите на пъпките: отделяна на първите листа – Размер на завръза до 20 мм | | | | |