

			1.2-1.6 л продукт /дка	Соя Прилага се като десикант – във фаза ВВСН 81-99 (начало на зреенето: начало на узряването на шушулките и семената – реколта (семена)) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 5 дни Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка	П	-		
34.	БЕЛУРЕ – Т Пробелте, С.А., Испания Разрешение № 01406 – ПРЗ-1/09.05.2016 г. Заповед №РД 11-611/19.04.2016 г. Заповед №РД 11-1059/19.06.2018 г.	трибенурон-метил – 750 г/кг	2 г/дка	Пшеница, Ечемик, Тритикале, Овес, Ръж Срещу едногодишни широколистни плевели:- ВВСН 13-39 през пролетта (3 листа разтворени до флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка Да не се прилага след ВВСН 39. Да не се използва продукта повече от веднъж на година на една и съща площ и култура.	П	-	непрофесионална	
35.	БЕНТАДОР Асценса Агро С.А., Португалия Разрешение №01671-ПРЗ-1/26.02.2019 г. Заповед №РД 11-349/15.02.2019 г. Заповед №РД 11-2183/21.09.2023 г.	бентазон – 480 г/л	Продуктът е идентичен на ПРЗ КАОС с Разрешение № 01470-ПРЗ-1/16.02.2017 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита.				втора професионална	
36.	БИАТЛОН 4 Д БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01312 – ПРЗ-1/16.0.2015 г. Заповед № РД 11-675/21.04.2015 г.	флорасулам – 54 г/кг тритосулфурон – 714 г/кг		Срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели	П	3 дни	втора професионална	Прилага се в ранни фази от развитието на плевелите
			4 -5,5 г/дка	Зърнено-житни култури – пшеница, есенен и пролетен ечемик, ръж, овес, тритикале Внася се във фаза ВВСН 13-39: 3-ти лист разтворен – флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима Брой мин/макс приложения – 1				
			4 -5,5 г/дка + 100 мл/дка адювант ДЕШ	Зърнено-житни култури – пшеница, есенен и пролетен ечемик, ръж, овес, тритикале Внася се във фаза ВВСН 13-39: 3-ти лист разтворен – флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима				

				Брой мин/макс приложения – 1				
37.	БИСМАРК КС Оксон Италия С.п.А Разрешение №01419 – ПРЗ-2/14.02.2017г. Заповед № РД 11- 946/31.05.2016 г. и Заповед №РД 11- 171/24.01.2017 г.	кломазон - 55 г/л пендиметалин - 275 г/л		Едногодишни житни и широколистни плевели	П	-	втора професионална	
			200-250 мл/дка	Памук Внася се след сеитба, преди поникване ВВСН 00-05 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			250-300 мл/дка	Тютюн Внася се преди разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			120-150 мл/дка	Рапица Внася се след сеитба, преди поникване ВВСН 00-05 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			200-300 мл/дка	Аспержи Внася се след беритба, преди показване на новите стъбла над почвата ВВСН 49-59 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			150-200 мл/дка	Резене Внася се след сеитба, преди поникване ВВСН 00-05 Преди разсаждане Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			150-200 мл/дка	Кориандър Внася се след сеитба, преди поникване ВВСН 00-05 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			200-300 мл/дка	Ориз (засят на сухо) Внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-05 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				