

			150 мл/дка	Ечемик Срещу Кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж: видими първи прашници) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	-		
			175 мл/продукт/дка	Ръж Срещу Кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) Листен пригор (<i>Rhynchosporiumsecalis</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтеж) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	-		
			175 мл/продукт/дка	Тритикале Срещу Кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтеж) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	-		
			175 мл/продукт/дка	Спелта Срещу Кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) – внася се във фаза (ВВСН 30-69 начало на удължаване на стъблото-край на цъфтеж) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	-		
49.	ВЕРБЕН/ ТАЛИУС ПРО Кортева Агрисайънс България ЕООД Разрешение № 02062-ПРЗ-4/11.01.2024 г. Заповед № РД 11-123-19.01.2023 г.	прокиназид – 50 г/л + протиоконазол – 200 г/л	75-100 мл/дка 60-100 мл/дка	Пшеница Срещу Ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>), кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), жълто-кафяви петна (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), базично гниене	П	-	втора професионална	със системно действие

Заповед №РД 11-1893/08.08.2023 г.
 Заповед №РД11-2654/08.11.2023 г.
 Заповед № РД11-2654/08.11.2023 г.
 Заповед № РД11-3054/28.12.2023 г.

	(<i>Oculimacula yallundae</i>) – внася се във фаза ВВСН 25-65 (5 братя - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка Дозата от 60 мл/дка да се използва при слаба степен на нападение/нисък инфекциозен фон		
100 мл/дка	Пшеница Срещу Фузариум по класа (<i>Fusarium</i> sp.) – внася се във фаза ВВСН 61-65 (начало на цъфтеж: видими първи прашници - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		
60-100 мл/дка	Ечемик Срещу Брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), мрежести петна (<i>Pyrenophora teres</i>), листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>), рамулариоза (<i>Ramularia collo-sugni</i>), кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia hordei</i>) – внася се във фаза ВВСН 25-49 (5 братя - видими първи осили (само при осилестите форми)) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка	П	-
75-100 мл/дка	Зимно тритикале Срещу Ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>)	П	-
60-100 мл/дка	Срещу кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>), базично гниене (<i>Oculimacula yallundae</i>) – внася се във фаза ВВСН 25-65 (5 братя - пълен цъфтеж: 50% от		

			<p>прашниците са зрели) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка</p>				
			<p>100 мл/дка</p> <p>Фузариум по класа (<i>Fusarium</i> sp.) – внося се във фаза ВВСН 61-65 (начало на цъфтеж: видими първи прашници - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка</p>				
			<p>75-100 мл/дка</p> <p>Ръж Срещу Брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>) – внося се във фаза ВВСН 25-49 (5 братя - видими първи осили (само при осилестите форми)) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка</p>	П	-		
50.	ВИБРАНС ДУО Синджента България ЕООД Разрешение №01521-ПРЗ- 3/09.04.2024 г. Заповед №РД 11- 2536/29.11.2017 г. Заповед №РД 11- 1445/25.07.2019 г. Заповед №РД 11- 1855/07.08.2023 г. Заповед № РД11- 876/04.04.2024 г.	Флудиоксонил 25 г/л Селаксан 25 г/л	<p>200 мл продукт / 100 кг семена</p> <p>Пшеница Срещу снежна плесен (<i>Monographella nivalis</i>), Септориоза (<i>Septoria nodorum</i>), Фузариено кореново гниене (<i>Fusarium spp.</i>), Твърда главня (<i>Tilletia caries</i>), Праховита главня (<i>Ustilago tritici</i>), Ризоктония (<i>Rhizoctonia spp.</i>) – внося се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Броймин/макс приложения – 1 Вибранс дуо може да се прилага неразреден или разреден до 1,5 л/100 кг семена.</p>	П	-	втора професионална	с комбинирано (системно и несистемно) действие
			<p>200 мл продукт / 100 кг семена</p> <p>Ечемик Срещу снежна плесен (<i>Monographella nivalis</i>), Ленточна болест (<i>Pyrenophora graminea</i>), Праховита главня (<i>Ustilago nuda</i>), Покрита главня (<i>Ustilago hordei</i>) , Фузариено кореново гниене (<i>Fusarium spp.</i>) – внося се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Броймин/макс приложения – 1</p>				