

			150 мл/дка	Ечемик Срещу Кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж: видими първи прашници) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	-		
			175 мл/продукт/дка	Ръж Срещу Кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) Листен пригор <i>Rhynchosporiumsecalis</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтеж) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	-		
			175 мл/продукт/дка	Тритикале Срещу Кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтеж) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	-		
			175 мл/продукт/дка	Спелта Срещу Кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) – внася се във фаза (ВВСН 30-69 начало на удължаване на стъблото-край на цъфтеж) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	П	-		
49.	ВЕРБЕН/ ТАЛИУС ПРО Кортева Агрисайънс България ЕООД Разрешение № 02062-ПРЗ-3/17.11.2023 г. Заповед № РД 11-123-19.01.2023 г.	прокиназид – 50 г/л + протиоконазол – 200 г/л	75 – 100 мл/дка	Пшеница Срещу Ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>), кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), жълто-кафяви петна (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), базично гниене (<i>Oculimacula yallundae</i>) – внася се във	П	-	втора професионална	със системно действие

Заповед №РД 11-1893/08.08.2023 г.
 Заповед №РД11-2654/08.11.2023 г.
 Заповед № РД11-2654/08.11.2023 г.

	фаза ВВСН 25-65 (5 братя - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		
75 – 100 мл/дка	Ечемик Срещу Брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), мрежести петна (<i>Pyrenophora teres</i>), листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>), рамулариоза (<i>Ramularia collo-sygni</i>), кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia hordei</i>) – внася се във фаза ВВСН 25-49 (5 братя - видими първи осили (само при осилестите форми)) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка	П	-
75-100 мл/дка	Зимно тритикале Срещу Ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>), кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>), базично гниене (<i>Oculimacula yallundae</i>) – внася се във фаза ВВСН 25-65 (5 братя - пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка	П	-
75-100 мл/дка	Ръж Срещу Брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>) – внася се във фаза ВВСН 25-49 (5 братя - видими първи осили (само при осилестите форми)) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка	П	-