

60.	<b>ГИЗМО 60 ФС</b> Ньюфарм ГмбХ § Ко. КГ, Австрия Разрешение №01610-ПРЗ- 2/22.11.2023 г. Заповед №РД 11- 1260/12.07.2018 г. Заповед №РД 11-985 от 13.05.2020 г. Заповед № РД11- 2725/16.11.2023 г.	<a href="#">тебуконазол</a> - 60 г/л	50 мл продукт/ 100 кг семена	<b>Зимна пшеница</b> Срещу Твърда (мазна) главня ( <i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia laevis</i> ), загниване на кълновете по време на поникване ( <i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.) и снежна плесен ( <i>Microdochium nivale</i> ) – внася се преди сеитба ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 500 мл/ 100 кг семена Сеитбена норма 15-25 кг/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
			50 мл продукт/ 100 кг семена	<b>Пролетна пшеница</b> Срещу Твърда (мазна) главня ( <i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia laevis</i> ), загниване на кълновете по време на поникване ( <i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.) и праховита главня ( <i>Ustilago tritici</i> ) – внася преди сеитба ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 500 мл/ 100 кг семена Сеитбена норма 15-25 кг/дка				
			50 мл продукт/ 100 кг семена	<b>Зимно и пролетно тритикале</b> Срещу Загниване на кълновете по време на поникване ( <i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.) – внася се преди сеитба ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 500 мл/ 100 кг семена Сеитбена норма 15-25 кг/дка				
			50 мл продукт/ 100 кг семена	<b>Зимна ръж</b> Срещу Загниване на кълновете по време на поникване ( <i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.) – внася се преди сеитба ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 500 мл/ 100 кг семена Сеитбена норма 15-25 кг/дка				

			50 мл продукт/ 100 кг семена	<b>Зимен ечемик</b> Срещу Загниване на кълновете по време на поникване ( <i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.), кафява праховита главня ( <i>Ustilago nuda</i> ) – внася се преди сеитба ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 500 мл/ 100 кг семена Сеитбена норма 15-25 кг/дка		-		
			50 мл продукт/ 100 кг семена	<b>Пролетен ечемик</b> Срещу Загниване на кълновете по време на поникване ( <i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.) - внася се преди сеитба ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 500 мл/ 100 кг семена Сеитбена норма 15-25 кг/дка		-		
			50 мл продукт/ 100 кг семена	<b>Овес</b> Срещу Загниване на кълновете по време на поникване ( <i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.) – внася се преди сеитба ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 500 мл/ 100 кг семена Сеитбена норма 15-25 кг/дка		-		
61.	<b>ГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СК</b> Синджента България ЕООД Разрешение № 01593-ПРЗ-2/19.03.2021 г. Заповед № РД 11-1044/19.06.2018 г. Заповед №РД 11-505 от 11.03.2021 г.	<a href="#">азоксистробин</a> - 250 г/л	60-80 мл/дка	<b>Пшеница</b> Срещу Кафява ръжда ( <i>Puccinia recondita</i> ) Брашнеста мана ( <i>Erysiphe graminis</i> ) Ран листен пригор ( <i>Septoria tritici</i> ) - внася се във фаза ВВСН 29-37 Ранен листен пригор ( <i>Septoria tritici</i> ) - внася се във ВВСН 30-69 (Начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка	П	35 дни	непрофесионална	Да се спазва Закона за пчеларството