

60. ГИЗМО 60 ФС
 Ньюфарм ГмбХ § Ко. КГ,
 Австрия
 Разрешение №01610-ПРЗ-
 2/22.11.2023 г.
 Заповед №РД 11-
 1260/12.07.2018 г.
 Заповед №РД 11-985 от
 13.05.2020 г.
 Заповед № РД11-
 2725/16.11.2023 г.

[тебуконазол](#) - 60
 г/л

50 мл продукт/ 100 кг семена	Зимна пшеница Срещу Твърда (мазна) главня (<i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia laevis</i>), загниване на кълновете по време на поникване (<i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.) и снежна плесен (<i>Microdochium nivale</i>) – внася се преди сеитба ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 500 мл/ 100 кг семена Сеитбена норма 15-25 кг/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
50 мл продукт/ 100 кг семена	Пролетна пшеница Срещу Твърда (мазна) главня (<i>Tilletia caries</i> , <i>Tilletia laevis</i>), загниване на кълновете по време на поникване (<i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.) и праховита главня (<i>Ustilago tritici</i>) – внася преди сеитба ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 500 мл/ 100 кг семена Сеитбена норма 15-25 кг/дка		-		
50 мл продукт/ 100 кг семена	Зимно и пролетно тритикале Срещу Загниване на кълновете по време на поникване (<i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.) – внася се преди сеитба ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 500 мл/ 100 кг семена Сеитбена норма 15-25 кг/дка		-		
50 мл продукт/ 100 кг семена	Зимна ръж Срещу Загниване на кълновете по време на поникване (<i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.) – внася се преди сеитба ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 500 мл/ 100 кг семена Сеитбена норма 15-25 кг/дка		-		

			50 мл продукт/ 100 кг семена	Зимен ечемик Срещу Загниване на кълновете по време на поникване (<i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.), кафява праховита главня (<i>Ustilago nuda</i>) – внася се преди сеитба ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 500 мл/ 100 кг семена Сеитбена норма 15-25 кг/дка		-		
			50 мл продукт/ 100 кг семена	Пролетен ечемик Срещу Загниване на кълновете по време на поникване (<i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.) - внася се преди сеитба ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 500 мл/ 100 кг семена Сеитбена норма 15-25 кг/дка		-		
			50 мл продукт/ 100 кг семена	Овес Срещу Загниване на кълновете по време на поникване (<i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.) – внася се преди сеитба ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 500 мл/ 100 кг семена Сеитбена норма 15-25 кг/дка		-		
61.	ГЛОБАЗТАР АЗТ 250 СК Синджента България ЕООД Разрешение № 01593-ПРЗ-2/19.03.2021 г. Заповед № РД 11-1044/19.06.2018 г. Заповед №РД 11-505 от 11.03.2021 г.	азоксистробин - 250 г/л	60-80 мл/дка	Пшеница Срещу Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>) Ран листен пригор (<i>Septoria tritici</i>) - внася се във фаза ВВСН 29-37 Ранен листен пригор (<i>Septoria tritici</i>) - внася се във ВВСН 30-69 (Начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка	П	35 дни	непрофесионална	Да се спазва Закона за пчеларството