

			100+70 или 130+70 двукратно	Царевича Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, както и балур от семена и коренища – внася се във фаза ВВСН 12-17 (2-ри до 7-ми разтворен лист на културата; до 1-3 лист на житните плевели; 10-20 см височина на балура или 2-4 лист на широколистните плевели) Брой мин/макс приложения – 1-2 Интервал между приложенията – 8-10 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Да не се прилага при сладка царевича	П	-		
95.	ЕМСЕ Шарда Кропхем Испания С.Л. Разрешение № 01811-ПРЗ-1/05.02.2020 г. Заповед №РД 11-271 от 24.01.2020 г.	МЦПА - 750 г/л	100 мл продукт /дка	Пролетни зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, ръж, овес) Срещу широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 13-32 (3 листа разтворени – вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Плевели в начални фази на развитие (максимум 20-30 см височина)	П	-	втора професионална	със системно действие
			100 мл продукт /дка	Зимни зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале) Срещу широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 31-39 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене – фаза	П	-		

				на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима)				
96.	ЕРГОН ВГ РОТАМ АГРОКЕМИКАЛ ЮРЪП ЛИМИТЕД- Англия Удостоверение № 01163- ПРЗ-1/28.11.2012 г. Заповед РД 11-1372 от 19.11.2012 г.	68 г/кг метсулфурон-метил + 682 г/кг тифенсулфурон-метил		Срещу двуседелни плевели (едногодишни широколистни плевели)		-	3	
			5-9 г/дка	Пшеница, тритикале и ръж				
			5-6 г/дка	Зимен ечемик				
			6 г/дка	Пролетен ечемик				
				Момент на приложение: есенно или пролетно третиране; ВВСН 13-39 (трети лист до флагов лист на житните култури и от котиледони до шести лист на плевелите) Максимален брой приложения: 1 Количество на работен разтвор: 10 – 40 л/дка				
97.	ЕСТЕРОН 600 ЕК Дау АгроСайънсис ЕКСПОРТ САС, Франция Разрешение № 01385– ПРЗ-1/25.03.2016 г. Заповед № РД 11- 397/16.03.2016 г.	2.4 Д - 600 г/л	50-100 мл/дка	Пшеница, Ечемик Срещу едногодишни широколистни плевели, паламида и поветица – внася се във фаза ВВСН 21-30(начало на братене-начало на удължаване на стъблото)ВВСН 14-16 (Фаза 4-6 лист на плевелите)	П	Пшеница, Ечемик - 60 дни; Царевича – не се изисква	втора професионална	
			50-100 мл/дка	Царевича: Срещу едногодишни широколистни плевели, паламида и поветица - ВВСН 13-16 (разтваряне на 3-ти лист до разтваряне на 6-ти лист), ВВСН 14-16(Фаза 4-6 лист на плевелите) Не се прилага при сладка царевича и при семепроизводство на царевича				
98.	ЕФАЗАТ 36 СЛ К. И Н.ЕФТИМИАДИС- БЪЛГАРИЯ ЕООД Разрешение № 01051- ПРЗ-3/09.01.2024 г. Заповед № РД 09- 439/04.06.2003 г. Заповед №РД 11-1841 от 11.08.2020 г. Заповед № РД11- 3029/22.12.2023 г.	360 г/л глифозат	400-1000 мл/дка	Лозя Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 25 л/дка	П	7 дни	втора професионална	със системно действие Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи,