			100 мл продукт/ дка	**Минимална употреба** **Артишок** Срещу Мана (*Bremia* sp.) – внася се при първи видими симптоми BBCH 41-81 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложението – 8-10 дни Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка Забележки: БАБХ не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотокичност при прилагането на ПРЗ ДИФАЗ за борба срещу вредител или група вредители, с които се води борба от Приложение № 2. Отговорността за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотокичност при прилагането на ПРЗ ДИФАЗ за борба срещу житни и широколистни плевели при царевица е на лицето, прилагащо продукта.	П	7 дни		
30.	**ЗОРВЕК ЕНДАВИА** Кортева Агрисайънс България ЕООД Разрешение № 02042-ПРЗ-1/18.10.2022 г. Заповед №РД11-2157/30.09.2022 г.	оксатиапипролин - 30 г/л бентиаваликарб-изопропил – 70 г/л	40 мл/дка	**Картофи** Срещу Мана (*Phytophtora infestans*) – внася се във фаза BBCH 10 (от клубени: първите листенца започват да нарастват) – до карантинния срок Брой мин/макс приложения – 4 Интервал между приложенията – 7-10 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка Интервал 7 дни - при по-силно нападе-ние на болестта	П	7 дни	втора професионална	с комбинирано действие (системно и несистемно)
31.	**ЗОРВЕК ВИНАБРИА** Кортева Агрисайънс България ЕООД Разрешение № 01864-ПРЗ-2/13.05.2021 г. Заповед №РД 11-1790 от 04.08.2020 г Заповед №РД 11-828 от 26.04.2021 г.	фолпет - 500 г/л + оксатиапипролин – 10 г/л	200 мл/дка	**Лозя (винени сортове)** Срещу Мана по лозя (*Plasmopara viticola*) – внася се във фаза BBCH 13-71 (третите листа са отворени -завръз: младите плодове започват да наедряват, остатъците от цветовете опадат) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10 дни	П	56 дни	втора професионална	със системно и несистемно действие