			250 г/дка	**Домати** Срещу Картофена мана *(Phytophthora infestans)* – внася се във фаза От BBCH 10 (котилдените се разгъват напълно) до 3 дни преди прибиране на реколтата Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П/О	3 дни		
			250 г/дка	**Марули** Срещу Мана *(Bremia lactucae)* – внася се във фаза От BBCH 10 (котиледоните са напълно развити; нарастващия връх или същинския лист видим) до 15 дни преди прибиране на реколтата Брой мин/макс приложения – 1-4 Интервал между приложенията – 10 дни Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка	П	15 дни		
			600 г/дка	**Цитрусови култури** Срещу Фитофторно гниене *(Phytophthora sp.)* – внася се във фаза BBCH 37- 81 Брой мин/макс приложения – 1-3 Интервал между приложенията – 30 дни Вода л/дка мин/макс – 110-200 л/дка	П	14 дни		
29.	**ЗОРВЕК ЕНДАВИА** Кортева Агрисайънс България ЕООД Разрешение № 02042-ПРЗ-1/18.10.2022 г. Заповед №РД11-2157/30.09.2022 г.	оксатиапипролин - 30 г/л бентиаваликарб-изопропил – 70 г/л	40 мл/дка	**Картофи** Срещу Мана (*Phytophtora infestans*) – внася се във фаза BBCH 10 (от клубени: първите листенца започват да нарастват) – до карантинния срок Брой мин/макс приложения – 4 Интервал между приложенията – 7-10 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка Интервал 7 дни - при по-силно нападе-ние на болестта	П	7 дни	втора професионална	с комбинирано действие (системно и несистемно)