

			125 мл продукт/ дка	<p><b>Минимална употреба</b>  <b>Семенпроизводство на житни култури в т.ч. фуражни и житни треви</b>  Срещу комплекс от патогени вкл. Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>) – внася се във фаза ВВСН 30-69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа: всички класчета са завършили цъфтежа)  Брой мин/макс приложения – 1  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка  Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за евентуална липса на ефикасност или проявена фитотоксичност от използването на <b>ИНПУТ</b> за разрешените минимални употреби, съгласно Приложение 2 на настоящата заповед.  Отговорността за евентуална липса на ефикасност или проявена фитотоксичност от използването на <b>ИНПУТ</b> за разрешените минимални употреби, съгласно Приложение 2 на настоящата заповед, е на лицето, употребяващо продукта.</p>	П	-		
95.	<b>ИНСИГНИЯ</b> БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01996-ПРЗ-1/11.01.2022 г. Заповед № РД 11-3166 от 30.12.2021 г.	<a href="#">пираклостробин</a> - 200 г/кг	50-100 г продукт /дка	<p><b>Царевница</b>  Срещу Северен листен пригор (<i>Setosphaeria turcica</i>), листна ръжда (<i>Puccinia sorghi</i>) – внася се във фаза ВВСН 31-65 (поява на първи възел - <i>мъжки цветове</i>: метлицата е цъфнала по цялата си дължина; <i>женски цветове</i>: косата е напълно развита)  Брой мин/макс приложения – 1  Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка</p>	П	-	непрофесионална	Със системно действие  При спазване на Закона за пчеларството
			50-100 г продукт /дка	<p><b>Царевница</b>  Срещу Дребни листни петна (<i>Kabatiella zaeae</i>) хелминтоспориоза (<i>Cochliobolus carbonum</i>) – внася се във фаза ВВСН 31-65 (поява на първи възел - <i>мъжки цветове</i>: метлицата е цъфнала по цялата си дължина, <i>женски цветове</i>: косата е напълно развита)  Брой мин/макс приложения – 1</p>	П			

				<p>Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка</p> <p>Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита ИНСИГНИЯ за контрол на болестите дребни листни петна (<i>Kabatiella zeae</i>) и хелминтоспориоза (<i>Cochliobolus carbonum</i>) при царевица.</p> <p>Отговорността за липса на на каквато и да било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита ИНСИГНИЯ за контрол на болестите дребни листни петна (<i>Kabatiella zeae</i>) и хелминтоспориоза (<i>Cochliobolus carbonum</i>) при царевица е на лицето прилагащо продукта.</p>				
96.	<b>ИНТЕЗОЛ 250 ЕВ</b> Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия	<b>Второ търговско име на ТАРКЗА 250 ЕВ</b>						
97.	<b>ИНТЕРЕСТ/ИНВЕСТ/ПРИН СИПЪЛ</b> Шарда Кропкем Испания, С.Л., Испания Разрешение № 01443–ПРЗ-4/22.11.2023 г. Заповед №РД 11-1564/29.08.2016 г. Заповед №РД 11-261/07.02.2017 г. Заповед №РД 11-2647/17.12.2019 г. Заповед №РД 11-2957 от 09.12.2021 г. Заповед № РД11-2595/07.11.2023 г.	<a href="#">дифеноконазол</a> – 30 г/л	200 мл/ 100 кг семена	<b>Пшеница</b> ) Твърда главня ( <i>Tilletia caries</i> ); Праховита главня ( <i>Ustilago tritici</i> ) - внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Максимална сеитбена норма 18 кг/семена/дка		-	втора професионална	със системно действие
			200 мл/ 100 кг семена	<b>Зимен и пролетен ечемик</b> Ленточна болест ( <i>Pyrenophora graminea</i> ); Праховита главня ( <i>Ustilago nuda</i> ) - внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Максимална сеитбена норма 18 кг/семена/дка				
98.	<b>ИНФИНИТО СК</b> Байер България ЕООД - Удостоверение № 547-ПРЗ - 2/11.08.2014 г. Заповед №РД 11-1939/02.10.2018 г.	625 г/л <a href="#">пропамокарб</a> <a href="#">хидрохлорид</a> + 62,5 г/л <a href="#">флуопиколид</a>	120-160 мл/дка	<b>Картофи</b> Мана ( <i>Phytophthora infestans</i> )		картофи, салатата (на полето) – 7 дни;	2	краставици, тиквички, тикви, пъпеши и дини (на полето), пъпеши и
			120-160 мл/дка	<b>Краставици, тиквички и тикви (полско производство)</b> Мана по краставици ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )		краставици, тиквички, тикви, пъпеши и дини (на полето), пъпеши и		