

			П – ро 25 мл/продукт/ дка	Интервал между приложенията – 7-10 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
127.	КИДЕКА Нюфарм САС, Франция Разрешение № 01509 – ПРЗ-1/ 01.11.2017 г. Заповед № РД 11- 2129/19.10.2017 г.	мезотрион - 100 г/л	75 – 150 мл продукт /дка	Царевица Срещу едногодишни широколистни и житни плевели - внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист) Брой мин/макс - 1 Вода л/дка мин/макс - 15 – 50 л/дка	П	-	втора професионална	
128.	КИЙНИЛ Индустриал Куимика Кий С.А., Испания Разрешение № 01881- ПРЗ-1/04.09.2020 г. Заповед №РД 11-1991от 27.08.2020 г.	флуроксипир 200 г/л	100 мл продукт/дка	Зърнено-житни култури (зимна пшеница, зимен-ечемик, тритикале, ръж, овес) Срещу широколистни плевели (след поникване) – внася се във фаза ВВСН 12- 39 (2 листа разтворени-фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	непрофесионална	със системно действие
			100 мл продукт/дка	Царевица Срещу широколистни плевели (след поникване) – внася се във фаза ВВСН 12-16 (разтваряне на втори лист-растежа продължава до разтваряне на шести лист) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-		
			150 мл продукт/дка	Семковни овощни видове (ябълки, круши, дюли, мушмули) Срещу широколистни плевели (след поникване) – внася се във фаза пролет- есен Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	15 дни		
			100 мл продукт/дка	Тревни площи Срещу широколистни плевели (след поникване) – внася се във фаза ВВСН 20-26 Брой мин/макс приложения – 1	П	-		