

				венчелистчета))				
			500 гр/дка	Краставици Брашнеста мана (<i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Podospha eraxanthii</i>) внася се при първи симптоми		-		
			500 гр/дка	Ягоди Брашнеста мана (<i>Podosphaera aphanis</i>) внася се преди ВВСН 59 (Масова бутонизация)		-		
			500 гр/дка	Пъпеш, дини, тикви Брашнеста мана (<i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Podosphaera xanthii</i>) внася се при първи симптоми		-		
			500 гр/дка	Грах Брашнеста мана (<i>Erysiphe pisi</i>) внася се при първи симптоми		-		
			500 гр/дка	Пипер Брашнеста мана (<i>Leveillula taurica</i>) внася се при първи симптоми		-		
			500 гр/дка	Домати Брашнеста мана (<i>Leveillula taurica</i>) внася се при първи симптоми		-		
121.	КОЛИС СК БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 209-ПРЗ-6/19.08.2022 г. Заповед №РД 11-1182/03.07.2018 г. Заповед РД 11-1496/30.07.2019 г. Заповед № РД 11-93 от 12.01.2021 г.	200 г/л боскалид 100 г/л крезоксим-метил	30-40 мл продукт/дка	Лозя Срещу Брашнеста мана (<i>Erysiphe necator/Oidiumtuckeri</i>) – внася се във фаза ВВСН 11-83 (първият лист е отворен и се разстила на страни от летораста-зърната формират цвят) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10-14 дни Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка	П	28 дни	втора професионална	с комбинирано действие (системно и несистемно)

	Заповед №РД 11-3174 от 31.12.2021 г. Заповед № РД 11-1827/09.08.2022 г.		40-50 мл продукт/дка	Краставици Срещу Брашнеста мана (<i>Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea</i>) – внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7-10 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П/О О П	3 дни		
			40-50 мл продукт/дка	Корнишони, тиквички – срещу Брашнеста мана (<i>Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea</i>) – внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7-10 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка		3 дни		
			40-50 мл продукт/дка	Дини, пъпеши, тикви – срещу Брашнеста мана (<i>Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea</i>) -внася се във фаза ВВСН 12-89 (втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен-пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7-10 дни Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка		3 дни		
122.	КОМЕТ ПРО БАСФ СЕ, Германия	второ търговско име на РЕТЕНГО 20 ЕК						
123.	КОМУГИН 5 ЕВ Суми Агро - България Удостоверение № 01079-ПРЗ/ 07.04.2010 г. Заповед № РД 09-395/08.12.2005 г.	50 г/л цифлуфенамид	20 мл/дка	Брашнеста мана по пшеница		42-63 дни	3	