

| | | | | | | | | |
|------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|
| | | | | Склеротиния Склеротиния (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i>) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка | | | | |
| 127. | КОПФОРС ЕКСТРА ЗЕНИТ КРОП САЙЪНСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД Разрешение № 01960-ПРЗ-2/13.10.2021 г. Заповед №РД 11-1288 от 18.06.2021 г. Заповед №РД 11-2326 от 12.10.2021 г. | <u>цимоксанил</u> – 60 г/кг + <u>мелен хидроксид</u> - 461 г/кг (чиста мед - 300 г/кг) (кандидат за замяна) | 200 г/дка | Картофи Срещу Мана (<i>Phytophthora infestans</i>) – внася се във фаза ВВСН 21-90 (поява на 1-во основно странично разклонение - стареене) Брой мин/макс приложения – 1-5 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка Да не се прилага повече от един път при производ-ство на ранни картофи | П | 14 дни | втора професионална | SPe8 - Опасен за пчелите с комбинирано действие (системно и несистемно) |
| | | | 200 г/дка | Лозя Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – внася се във фаза ВВСН 55-80 (съцветията набъбват, цветчетата са затворени и плътно прилепнали-начало на узряване) Брой мин/макс приложения -1-4 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 50-120 л/дка | П | 28 дни | | |
| | | | 200 г/дка | Домати Срещу Картофена мана (<i>Phytophthora infestans</i>), Кафяви листни петна (алтернария) (<i>Alternaria solani</i>) – внася се във фаза ВВСН 51-71 (първо съцветие изправена пъпка – първа китка: първи плод с типичен размер) Брой мин/макс приложения -1-4 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка | П | 3 дни | | |
| 128. | КОРСЕЙТ 60 ВГ Кортева Агрисайънс България ЕООД Разрешение № 01400 – ПРЗ-2/19.03.2021 г. Заповед №РД 11-685/22.04.2016 г. Заповед №РД 11-2377/22.11.2018 г. | <u>симоксанил</u> 600 г/кг | 20-30 г/дка с раб. р-р 50-130 л/дка | Домати Мана (<i>Phytophthora infestans</i>) Максимален брой приложения за ВП – 4 бр., с интервал между третиранията от 7 дни (от разсаждането до пълна зрялост, ВВСН 15-89 от пети същински лист до пълна зрялост). | | Домати Краставици, Тиквички Дини, Пъпеша, Тикви-3; Марули, Лук, Чесън, Праз, Картофи - 7 | втора професионална | |
| | | | 20-30 г/дка с раб. р-р 50-130 л/дка | Краставици, Тиквички Кубинска мана (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|-----------------|--|--|
| | Заповед №РД 11-520 от 11.03.2021 г. | | | Максимален брой приложения за ВП – 4 бр., с Интервал между третиранията от 7 дни (от разсаждането до пълна зрялост, ВВСН 15-89 от пети същински лист до пълна зрялост). | | | | | |
| | | | | 40 г/дка с раб. р-р 50-100 л/дка | | | | | Дини, Пъпешни, Тикви Кубинска мана (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) Максимален брой приложения за ВП – 4 бр., с Интервал между третиранията от 7 дни (от разсаждането до пълна зрялост, ВВСН 15-89 от пети същински лист до пълна зрялост). |
| | | | | 20-40 г/дка с раб. р-р 50-100 л/дка | | | | | Марули Мана (<i>Bremia lactucae</i>) Максимален брой приложения за ВП – 4 бр., с Интервал между третиранията от 7 дни във фенофази ВВСН 19-49 от девет или повече същински разтворени листа до формирана цялата листна маса. |
| | | | | 30-40 г/дка с раб. р-р 30-100 л/дка | | | | | Лук, Чесън, Праз Мана (<i>Peronospora destructor</i>) Максимален брой приложения за ВП – 4 бр., с Интервал между третиранията от 7 дни във фенофази ВВСН 15-48 от пети лист >3 см ясно видим до при 50% от растенията, листата са омекнали и прегънати. |
| | | | | 15-20 г/дка с раб. р-р 30-100 л/дка | | | | | Картофи Мана (<i>Phytophthora infestans</i>) Максимален брой приложения за ВП – 5 бр., с Интервал между третиранията от 7 дни във фенофази ВВСН 15-93 от пет разтворени листа до повечето листа са пожълтели. |
| 129. | КОСАЙД 2000 ВГ Шпийс Урания Кемикъл ГмбХ, Германия | меден хидроокис -538 г/кг=350 г/кг чиста мед | 0,12 % (120 г за 100 л/дка раб.р-р) | Лоза Мана по лоза | П | Лоза -14 дни; Бадем -28; Лешник, Орех*:-28; | непрофесионална | | |