

155.	ЛАУДИС ОД Байер България ЕООД Разрешение № 0581-ПРЗ -5/07.07.2020 г. Заповед №РД 12-1/09.01.2009 г Заповед РД 11-1252 от 13 октомври 2011 Заповед РД 11-990 от 30.07.2012г. Заповед РД 11-211 от 27.02.2012 г. Заповед №РД 11-1526 от 02.07.2020 г.	44 г/л темботрион+ 22 г/л изоксадифен-етил (антидот)	170-225 мл продукт/дка	Царевница, сладка царевница Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист-разтваряне на осми лист) и от котиледони до 6-ти лист на широколистни плевели и до 2-ри – 3-ти лист на едногодишните житни плевели Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка	П	-	втора професионална	
156.	ЛАУДИС ВГ Байер България ЕООД Разрешение № 01177-ПРЗ-2/07.07.2020 г. Заповед №РД 11-177/18.02.2013 г Заповед №РД 11-1525 от 02.07.2020 г.	200 г/кг темботрион+ 100 г/л изоксадифен-етил (антидот)	37,5-50 г продукт/дка + 200 мл/дка адювант	Царевница (зърно, фураж и силаж) Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист-разтваряне на осми лист) и от котиледони до 6-ти лист на широколистни плевели и до 2-ри – 3-ти лист на едногодишните житни плевели, при височина на балура от семе и коренища 15-25 см Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка Продуктът се използва с адювант Актироб Б или Мерио	П	-	втора професионална	със системно действие
			25 г продукт/дка + 100 мл/дка Адювант	Царевница (зърно, фураж и силаж) Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист-разтваряне на осми лист) И от котиледони до 6-ти лист на широколистни плевели и до 2-ри – 3-ти лист на едногодишните житни плевели, при височина на балура от семе и коренища 15-25 см Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7-14	П	-		

				дни Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка Продуктът се използва с адювант Актироб Б или Мерио				
			37,5-50 г продукт/дка + 200 мл/дка адювант	Сладка царевица Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист-разтваряне на осми лист) и от котиледони до 6-ти лист на широколистни плевели и до 2-ри – 3-ти лист на едногодишните житни плевели, при височина на балура от семе и коренища 15-25 см Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка Продуктът се използва с адювант Актироб Б или Мерио	П	-		
			25 г продукт/дка + 100 мл/дка адювант	Сладка царевица Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист-разтваряне на осми лист) и от котиледони до 6-ти лист на широколистни плевели и до 2-ри – 3-ти лист на едногодишните житни плевели, при височина на балура от семе и коренища 15-25 см Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7-14 дни Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка Продуктът се използва с адювант Актироб Б или Мерио	П	-		

157.	ЛЕНТАГРАН ВП Белхим Кроп Протекшън Н.В./С.А., Белгия Разрешение № 01141- 3/14.07.2023 г. Заповед № РД 11- 1249/13.10.2011 г. Заповед №РД 11-1558 от 07.07.2021 г. Заповед №РД11- 1649/10.07.2023 г.	450 г/кг пиридат	200 г/дка	Зеле (с изключение на къдраво и брюкселско зеле) Карфиол, Броколи Срещу едногодишни широколистни и плевели – прилага се през пролетта, 2-4 седмици след засаждане (фенофаза 4-6-ти лист на културата) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка	П	42 дни за зеле и броколи; 49 дни за карфиол	2	
			200 г/дка	Праз Срещу едногодишни широколистни - прилага се еднократно през пролетта, 3-ти лист ясно видим (по-голям от 3cm) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 30-40 л/дка	П	28 дни		
			200 г/дка	Люцерна Срещу Обикновен щир (<i>Amaranthus retroflexus</i>), Татул (<i>Datura stramonium</i>), Едногодишна живолина (<i>Mercurialis annua</i>) – внася се във фаза ВВСН 11-39 Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс 20-60 л/дка	П	28 дни		
			200 г/дка	Сладка царевича Срещу едногодишни широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 13-18 На културата и фаза 1-2 листа на плевелите Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс 20-60 л/дка	П	-		
			100 г продукт/ дка	Минимална употреба Тютюн Срещу едногодишни широколистни плевели – внася се във фаза След поникване до ВВСН 39 на културата (във фаза 1-2 листа на плевелите) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	28 дни		
			50 г продукт/ дка	Или след поникване до ВВСН 39 на културата (след поникване на плевелите до фаза 1 лист на плевелите) Брой макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 2 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				