184.	**МЕТРИК** Сертис Белхим БВ, Нидерландия Разрешение №01609-ПРЗ-2/02.10.2023 г. Заповед №РД 11-1255/12.07.2018 г. Заповед №РД 11-6 от 02.01.2020 г. Заповед №РД11-2154/20.09.2023 г.	метрибузин - 233 г/л кломазон - 60 г/л.	150 мл/дка	**Картофи** Срещу Едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди поникване Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 20-40 л/дка	П	72 дни	непрофесионална	със системно действие
185.	**МИЗУКИ** Ничино Юръп Ко., Лтд С/О, Лафер & Партнър ВТХ ГмбХ, Австрия Разрешение № 02018-ПРЗ-1/14.04.2022 г. Заповед №РД 11-641 от 31.03.2022 г.	пирафлуфен-етил - 10,6 г/л	200 мл продукт/ дка	**Картофи** Като десикант – внася се във фаза BBCH 91 (Начало на пожълтяване листата) Преди прибиране на реколтата (юни-октомври)	П	7 дни	втора професионална	с несистемно действие
			100-200 мл продукт/ дка	**Картофи** Срещу едногодишни широколистни плевели – внася се във фаза BBCH 00-09 (период на покой- поникване) 5% от растенията в посева се виждат (март-октомври)		-		
			200 мл продукт /дка	**Домати** Срещу едногодишни широколистни плевели-внася се във фаза Преди разсаждане (до 1 ден преди разсаждане) (март-юни)		-		
			200 мл продукт /дка	**Домати** Срещу едногодишни широколистни плевели- BBCH 15-72 (пети същински лист по гл. стъбло - втора китка: първи плод с типичен размер) (април-август)		28 дни		
			87,5 мл продукт/ дка	**Артишок** Срещу едногодишни широколистни плевели- BBCH 12-14 (юли-октомври)		-		
			200 мл продукт/ дка	**Лозя** Странични издънки (максимална дължина 15-20 см) – внася се във фаза BBCH 19-75 (9 и повече листа са отворени - гроздовите зърна са с размер на грахово		3 дни		

				зърно) (април-август)				
			200 мл продукт/ дка	**Лозя** Едногодишни широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-75 (покой - гроздовите зърна са с размер на грахово зърно) (февруари-септември)		3 дни		
			200 мл продукт/ дка	**Ябълка, круша, дюля, мушмула, японска мушмула, китайска круша Наши** Срещу Коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) ВВСН 51-75 (набъбване на неразцъфналите пъпки - плодовете са достигнали половината от окончателния си размер) (март-септември) Да не се събират и консумират плодове от земята след третиране с продукта		30 дни		
			200 мл продукт/ дка	**Ябълка, круша, дюля, мушмула, японска мушмула, китайска круша Наши** Срещу едногодишни широколистни плевели-внася се във фаза ВВСН 00-75 (покой - плодовете са достигнали половината от окончателния си размер) (февруари-септември)		30 дни		
			200 мл продукт/ дка	**Праскова, нектарина, слива, кайсия, череша, вишна** Срещу Коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) – внася се във фаза ВВСН 51-75 (цветните пъпки са затворени, виждат се светлокафяви люспи - плодовете са достигнали половината от окончателната си големина) (март-август)		30 дни		
			200 мл продукт/ дка	**Праскова, нектарина, слива, кайсия, череша, вишна** Срещу едногодишни широколистни плевели - ВВСН 00-75 (покой- плодовете са достигнали половината от окончателната си		30 дни		

				големина) (февруари-август)				
			200 мл продукт/ дка	**Орех, обикновена леска, Фисташка (Шам-фъстък), кестен** Срещу коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) – внася се ВВСН 13-76 (февруари-септември)		21 дни		
			200 мл продукт/ дка	**Орех, обикновена леска, Фисташка (Шам-фъстък), кестен** Срещу едногодишни широколистни плевели - – внася се ВВСН 13-76 (февруари-септември)		21 дни		
			200 мл продукт/ дка	**Киви** Коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) – внася се във фаза ВВСН 19-85 (февруари-септември)		7 дни		
			200 мл продукт/ дка	**Киви** Срещу едногодишни широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-85 (февруари-септември)		7 дни		
			200 мл продукт/ дка	**Маслини** Срещу Коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) – внася се във фаза ВВСН 19-85 (февруари-септември) Да не се събират и консумират плодове от земята след третиране с продукта		7 дни		
			200 мл продукт/ дка	**Маслини** Срещу едногодишни широколистни плевели– внася се във фаза ВВСН 19-85 (февруари-септември) Да не се събират и консумират плодове от земята след третиране с продукта		7 дни		
			200 мл продукт/ дка	**Минимална употреба** **Сладък и горчив бадем** Срещу коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) – внася се във фаза ВВСН 13-76		21 дни		

			200 мл продукт/ дка	**Минимална употреба** **Сладък и горчив бадем** Срещу едногодишни широколистни плевели– внася се във фаза BBCH 13-76		21 дни		
			200 мл продукт/ дка	**Минимална употреба** **Цитрусови култури** Срещу едногодишни широколистни плевели–внася се във фаза BBCH 00-81 (февруари-септември) Да не се събират и консумират плодове от земята след третиране с продукта		30 дни		
			100 мл продукт/ дка	**Минимална употреба** **Банани** Срещу едногодишни широколистни плевели–внася се рано след поникване на плевелите BBCH 19-85 (януари-декември) Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита **МИЗУКИ** за контрол на коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) и едногодишни широколистни плевели при сладък и горчив бадем, за контрол на едногодишни житни плевели при цитрусови култури и банани. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при прилагането на продукта за растителна защита **МИЗУКИ** за контрол на коренови издънки (максимална височина 15 см, преди лигнифициране) и едногодишни широколистни плевели при сладък и горчив бадем и за контрол на едногодишни житни плевели при цитрусови култури и банани е на лицето, прилагащо продукта.		15 дни		

186.	**МИНСТРЕЛ 20 ЕК** ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А., Нидерландия Разрешение № 01990-ПРЗ-2/01.08.2022 г. Заповед № РД 11-2623 от 04.11.2021 г. Заповед № РД 11-1612/15.07.2022 г.	флуроксипир 200 г/л	75-100 мл продукт/дка	**Зимни и пролетни зърнено-житни култури: Пшеница (вкл. и твърда), ечемик, ръж, овес и тритикале** Срещу широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 13-39 (3 листа разтворени- флаговият лист е напълно разтворен) В ранна фаза на развитие и активен растеж на плевелите Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
			75-100 мл продукт/дка	**Царевица** Срещу широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 13-16 (3 листа разтворени-6 листа разтворени) В ранна фаза на развитие и активен растеж на плевелите Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-		
187.	**МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД /САМСОН ЕКСТРА 6 ОД /ФОРНЕТ ЕКСТРА 6 ОД /НИШИН ЕКСТРА 6 ОД/ / ПАМПА ПРЕМИУМ 6 ОД/ ДАИЧИ ЕКСТРА 6 ОД** ИСК Биосайънсис Юръп Н.В., Белгия Разрешение № 01101-ПРЗ-5/03.04.2023 г. Заповед № РД 11-1283/28.11.2013г., Заповед №РД 11-1238/17.07.2015 г. Заповед №РД 11-506 от 11.03.2021 г. Заповед № РД11-547/09.03.2023 г.	60 г/л никосулфурон	50-75 мл/дка двукратно, като първото третира не с доза 50 мл/дка, а второто (7-10 дни по-късно) с доза 25 мл/дка	**Царевица (за фураж и зърно)** Срещу едногодишни, многогодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист- разтваряне на осми лист) на културата Срещу балур Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 лд/ка	П	-	втора професионална	със системно действие