

202.	НИФУР ОД Шарда Кропкем Испания, С.Л. Разрешение № 01853- ПРЗ-1/10.07.2020 г. Заповед №РД 11-1576 от 08.07.2020 г.	никосулфурон - 40 г/л	Продуктът е идентичен на ПРЗ ШАРНИК/НИША с Разрешение № 01788-ПРЗ – Издание:2/17.05. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита.					
203.	НИШИН 4 ОД ИСК Биосайансис Юръп С.А., Белгия	Второ търговско име на САМСОН 4 ОД						
204.	ОВЪРТЕЙК ГЛОБАХЕМ Н.В., Белгия Разрешение № 02078- ПРЗ-1/30.06.2023 г. Заповед №РД11- 1343/07.06.2023 г.	флуроксипир- метил - 141,12 г/л флорасулам -2,45 г/л	150 мл/дка	Новозасяти тревни площи - тревни площи за спортни цели, голф игрища, тревни площи за конни надбягвания, боулинг игрища на открито, летища и чимове Срещу широколистни плевели – внася се във фаза след ВВСН 12 (2 листа разтворени) и млади активно растящи плевели Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 12-40 л/дка Продуктът да се прилага в периода от март до май.	П	-	втора професионална	със системно действие
			180 мл/дка	Тревни площи - тревни площи за спортни цели, голф игрища, тревни площи за конни надбягвания, боулинг игрища на открито, летища и чимове Срещу широколистни плевели Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 12-40 л/дка Продуктът да се прилага в периода от март до септември.	П	-		
205.	ОМНЕРА ОД/ ТРИОФЛЕКС ОД ФМС Агро България ЕООД Разрешение № 01502– ПРЗ-4/15.11.2021 г. Заповед № РД 11- 1842/05.09.2017 г. Заповед №РД 11- 379/01.03.2018 г.	флуроксипир -135 г/л метсулфурон- метил - 5 г/л тифенсулфурон- метил – 30 г/л	50-100 мл/дка	Зимни житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале, овес, твърда пшеница) Срещу широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 20-39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка	П	-	втора професионална	

	Заповед № РД 11-80 от 11.01.2021 г. Заповед №РД 11-2690 от 11.11.2021 г.			Дозата от 50-75 мл/дка е приложима само за силно чувствителни плевели				
			50-100 мл/дка	Пролетни житни култури (пшеница, ечемик, овес, твърда пшеница) Срещу широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-39 (два листа разтворени - фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка Дозата от 50-75 мл/дка е приложима само за силно чувствителни плевели		-		
206.	ОНИКС Сертис Белхим БВ, Нидерландия Разрешение № 01585- ПРЗ-4/14.07.2023 г. Заповед № РД 11- 913/30.05.2018 г. Заповед №РД 11- 2247/07.11.2018 г. Заповед №РД 11-26 от 06.01.2021 г. Заповед №РД11- 1650/10.07.2023	пиридат - 600 г/л		Срещу едногодишни широколистни плевели	П	-	втора професионална	с несистемно действие
			150мл/продукт т/дка	Царевница Внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтворен 2-ри лист-разтворен 8-ми лист) на културата Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			75 мл/дка	Царевница Внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтворен 2-ри лист-разтворен 8-ми лист) на културата Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				