

				употребите на ПРЗ ОРТИВА ТОП СК съгласно Приложение № 2 на настоящата заповед. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите на ПРЗ ОРТИВА ТОП СК съгласно Приложение № 2 на настоящата заповед е на лицето, прилагащо продукта. Употребите при минималните култури в Приложение № 2 да се впишат отделно на етикета.				
186.	ПАСУЪРД 25 ВГ НЮФАРМ Гмбх & Ко.КГ Австрия Разрешение №01628-ПРЗ-1/09.10.2018 г. Заповед №РД 11-1955/03.10.2018 г. Заповед №РД 11-979 от 13.05.2020 г.	тебуконазол - 25 г/кг	50 г продукт/ дка	Костилкови овощни видове (Праскови, нектарини, кайсии) Срещу Ранно кафяво гниене (<i>Monilinia laxa</i>), Късно кафяво гниене (<i>Monilinia fructigena</i>), Брашнеста мана (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) – внася се Пролет, лято ВВСН 79-85 (плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер-оцветяването се развива) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал мин/макс приложения – 7 Вода л/дка мин/макс - 80-200 л/дка	П	14 дни	втора професионална	Да се спазва закона за пчеларството
			50 г продукт/ дка	Семкови овощни видове- ябълки Срещу струпяване (<i>Venturia inaequalis</i>) – внася се във фаза ВВСН 79-85 (плодовете са достигнали 90% от окончателния си размер-напреднало узряване) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал мин/макс приложения – 8 Вода л/дка мин/макс - 100-200 л/дка		14 дни		
			30-40 г продукт/ дка	Лозя Срещу Брашнеста мана (<i>Uncinula necator</i>) – внася във фаза ВВСН 57-81 (съцветията са напълно развити; цветчетата са разделени-начало на узряване) Брой мин/макс приложения – 1-3		14 дни		

				Интервал мин/макс приложения – 10-14 Вода л/дка мин/макс - 40-100 л/дка				
			100 г продукт/ дка	Рапица Срещу Бяло гниене (склеротиниоза) (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) – внася се във фаза Есен, пролет ВВСН 32-70 (видимо нарастване на 2 междувъзлие-край на цъфтежа) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал мин/макс приложения – 10-15 Вода л/дка мин/макс - 100 л/дка		56 дни		
187.	ПАРАДАЙЗ Шарда Кропкем Испания, С.Л Разрешение № 01901-ПРЗ-1/02.12.2020 г. Заповед №РД 11-2622 от 24.11.2020 г.	протиоконазол – 250 г/л	Продуктът е идентичен на ПРЗ ПРАКТИС с Разрешение № 01860-ПРЗ - Издание 1/10.07.2020 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита.			втора професионална	със системно действие	
188.	ПАУЪР Шарда Кропкем Испания, С.Л., Испания Разрешение № 01900-ПРЗ-1/02.12.2020 г. Заповед №РД 11-2621 от 24.11.2020 г.	протиоконазол – 250 г/л	Продуктът е идентичен на ПРЗ ПРАКТИС с Разрешение № 01860-ПРЗ - Издание 1/10.07.2020 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита.			втора професионална	със системно действие	
189.	ПЕРГАДО Д Синджента България ЕООД Разрешение №01646-ПРЗ-1/06.12.2018 г. Заповед № РД 11-2384/23.11.2018 г.	мандипропамид – 62,5 г/л дитианон – 250 г/л	140-200 мл/дка	Лозя Срещу Мана (<i>Plasmopara viticola</i>) – внася се във фаза ВВСН 13-79(третите листа са отворени-повечето от зърната се събират, грозда се затваря) Брой мин/макс приложения – 4 Интервал между приложенията – 8-12 Вода л/дка мин/макс – 15-100 л/дка	П	-	втора професионална	
190.	ПЕРГАДО МЕД 27 ВГ Синджента България ЕООД Удостоверение № 01135-ПРЗ-1/20.05.2011 г.	25 г/кг мандипропамид 139,5 г/кг мед (под формата на	500 г/дка	Мана по лоза (<i>Plasmopara viticola</i>): внася се след образуване на ягоридата по лозата		21 дни лозя; 3 дни домати	непрофесионална	