

			125 мл/ дка	<b>Минимална употреба</b> <b>Ориз</b> (Clearfield/Клиърфийлд толерантни хибриди) ВВСН 12-22 ( 2 листа разтворени до забележими 2 братя) Да се прилага с Деш ХЦ в доза 100 мл				
			87,5 мл/ дка	<b>Минимална употреба</b> <b>Ориз (Clearfield/ Клиърфийлд толерантни хибриди )- ВВСН 13-14</b> (3-4 разтворени листа) Да се прилага с Деш ХЦ в доза 100 мл				
244.	<b>ПУЛСАР ПЛЮС</b> БАСФ СЕ, Германия Разрешение №01458– ПРЗ-2/06.02.2019 г. Заповед № РД 11- 144/23.01.2017 г. Заповед №РД 11-176 от 22.01.2019 г.	<a href="#">имазамокс</a> 25 г/л	120-200 мл/ дка	<b>Слънчоглед хибриди толерантни на</b> <b>Имдазолинони/имазамокс, вкл.</b> <b>Клиърфийлд и Клиърфийлд Плюс</b> <b>хибриди</b> Срещу едногодишни житни и широколистни плевели и синя китка ( <i>Orrobanche spp.</i> ) При силно нападение, срещу по- развити или трудно унищожими плевели да се прилага по високата доза 200 мл/дка. Не се разрешава сеитба на рапица и други култури от сем. Кръстоцветни и захарно цвекло 12 месеца след третиране с продукта		-	втора професионална	
245.	<b>ПУЛСАР СТАРТ</b> БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 02050- ПРЗ-1/16.11.2022 г. Заповед №РД11- 2390/02.11.2022 г.	имазамокс (а.в. кандидат за замяна) – 120 г/л	1,6 мл/дка при 0,4875 кг/дка семена (320 мл/100 кг семе)	<b>Слънчоглед-Клиърфийлд Плюс</b> <b>хибриди</b> Срещу Синя китка ( <i>Orobanche sp.</i> ) – внося се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс 1.5-3 л/100 кг семена Максимум 7500 семена/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
246.	<b>ПУМА СУПЕР</b> <b>7,5 ЕВ</b> Байер България ЕООД Разрешение № 05 65 – ПРЗ-2/08.02.2016г. Заповед №РД 11- 160/29.01.2016 г. Заповед №РД 11-26 от 03.01.2020 г.	69 г/л <a href="#">феноксапроп-П-</a> <a href="#">етил</a> + 75 г/л <a href="#">мефенпир-</a> <a href="#">диетил</a> (антидот)	100 мл/дка	Срещу Лисича опашка ( <i>Alopecurus myosuroides</i> ), Див овес ( <i>Avena fatua</i> ), тръстичина/двувцветно сорго ( <i>Phalaris spp.</i> ), Обикновена метлица ( <i>Poa trivialis</i> ), Ветрушка ( <i>Apera spica venti</i> )  <b>Пшеница и ечемик</b> Прилага се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени – Край на братенето. Видими са максимален брой братя (есен).Прилага се във фенофаза втори лист-братене на плевелите:	-	-	втора професионална	