

				употреби е на лицето, прилагащо продукта.				
231.	РЕВУС 250 СК Синджента България ЕООД Разрешение № 01047-ПРЗ-5/26.03.2020 г. Заповед РД 11-1246 от 13 октомври 2011 Заповед № РД 11 – 1741/29.08.2018 г. Заповед №РД 11-734 от 19.03.2020 г.	мандипропамид - 250 г/л	50 мл продукт /дка	<b>Картофи</b> Срещу Мана ( <i>Phytophthora infestans</i> ) – внася се във фаза 31-91 (начало на сгъстяване, 10% от растенията в редовете се допират - начало на пожълтяване на листата) Брой мин/макс приложения – 6 Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка Интервал между приложенията – 7 дни	П	21 дни	непрофесионална	
			50 мл продукт /дка	<b>Домати</b> Срещу Мана ( <i>Phytophthora infestans</i> ) – внася се във фаза 21-89 (видима поява на първо върхно разклонение - пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 4 Вода л/дка мин/макс – 30-150 л/дка Интервал между приложенията – 7 дни	П	3 дни		
			50 мл продукт /дка	<b>Домати</b> Срещу Мана ( <i>Phytophthora infestans</i> ) – внася се във фаза 11-89 (първи същински лист по основното стъбло - пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 4 Вода л/дка мин/макс – 20-1520 л/дка Интервал между приложенията – 7 дни	О	3 дни		
			60 мл продукт /дка	<b>Лозя</b> Срещу Мана ( <i>Plasmopara viticola</i> ) – внася се във фаза ВВСН 9-81 (първият лист е отворен – начало на узряване: зърната започват да развиват характерните за сорта особености) Брой мин/макс приложения – 4 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л/дка Интервал между приложенията – 10 дни	П	21 дни		

50-60 мл продукт /дка	<b>Патладжан</b> Срещу Мана ( <i>Phytophthora infestans</i> ) – внася се във фаза ВВСН 11-89 (първи същински лист на основното стъбло – пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 4 Вода л/дка мин/макс – 60-120 л/дка Интервал между приложенията - 7	О	3 дни
50-60 мл продукт /дка	<b>Патладжан</b> Срещу Мана ( <i>Phytophthora infestans</i> ) – внася се във фаза ВВСН 21-89 (видима поява на първо върхно разклонение – пълна зрялост) Брой мин/макс приложения – 4 Вода л/дка мин/макс – 30-150 л/дка Интервал между приложенията - 7	П	3 дни
60 мл продукт /дка	<b>Пъпеш, тиква, тиквички</b> Срещу Мана ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> ) – внася се във фаза ВВСН 11-89 (първи същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост) Брой мин/макс приложения – 4 Вода л/дка мин/макс – 60-120 л/дка Интервал между приложенията – 7	П/О	3 дни
60 мл продукт /дка	<b>Маруля, рукола, ендивия, полска салата, цикория, червен синап, зелени салати, спанак за листа, кресон, тученица, листно цвекло и други салати</b> Срещу Мана ( <i>Bremia lactucae</i> , <i>Peronospora sp.</i> ) – внася се във фаза ВВСН 11-49 (разтворен първи същински лист – формирана цялата листна маса) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка	О	7 дни

		60 мл продукт /дка	<b>Маруля, рукола, ендивия, полска салата, цикория, червен синап, зелени салати, спанак за листа, кресон, тученица, листно цвекло и други салати</b> Срещу Мана ( <i>Bremia lactucae</i> ) внася се във фаза ВВСН 11-49 (разтворен първи същински лист – формирана цялата листна маса) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията - 7 Вода л/дка мин/макс – 10-100 л/дка	П	7 дни
		60 мл продукт /дка	<b>Пресни билки, магданоз</b> Срещу Мана ( <i>Plasmopara crustosa</i> , <i>Peronospora sp.</i> ) – внася се във фаза ВВСН 11-39 Брой мин/макс приложения – 1 Интервал между приложенията - 7 Вода л/дка мин/макс – 20-60 л/дка	О	7 дни
		60 мл продукт /дка	<b>Пресни билки, магданоз</b> Срещу Мана ( <i>Plasmopara crustosa</i> , <i>Peronospora sp.</i> ) – внася се във фаза ВВСН 11-49 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията - 7 Вода л/дка мин/макс – 10-100 л/дка	П	7 дни
		60 мл продукт /дка	<b>Декоративни растения, зелени и цъфтящи храсти, рози</b> Срещу Мана ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> ) – внася се във фаза ВВСН 11-89 Брой мин/макс приложения – 4 Интервал между приложенията - 7 Вода л/дка мин/макс – 60-120 л/дка	П	-

232.	РЕДИГО 100 ФС Байер България ЕООД Разрешение № 01528–ПРЗ- 1/19.12.2017 г. Заповед №РД 11- 2655/06.12.2017 г. Заповед №РД 11- 2070/22.10.2018 г. Заповед №РД 11-1965 от 25.08.2020 г.	<a href="#">протиоконазол</a> – 100 г/л	100 мл/ продукт/100 кг семена	<b>Пшеница</b> Срещу Твърда (мазна) Главня ( <i>Tilletia caries</i> ), Петносване на плевите ( <i>Septoria nodorum</i> ), Фузарийно кореново гниене ( <i>Fusarium spp.</i> ), Снежна плесен ( <i>Microdochium nivale</i> ), Праховита главня ( <i>Ustilago tritici</i> ) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Броймин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 200-400 мл/ 100 кг семена	-	-	първа професионална	
			100 мл/ продукт/100 кг семена	<b>Ечемик</b> Срещу Фузарийно кореново гниене ( <i>Fusarium spp.</i> ), Снежна плесен ( <i>Microdochium nivale</i> ), Ленточна болест ( <i>Pyrenophora graminea</i> ) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Броймин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 200-400 мл/ 100 кг семена				
			100 мл/ продукт/100 кг семена	<b>Ръж</b> Срещу Фузарийно кореново гниене ( <i>Fusarium spp.</i> ), Снежна плесен ( <i>Microdochium nivale</i> ), Стъблена главня ( <i>Urocystis occulta</i> ) – внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Броймин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 200-400 мл/ 100 кг семена				
			100 мл/ продукт/100 кг семена	<b>Тритикале</b> Срещу Фузарийно кореново гниене ( <i>Fusarium spp.</i> ), снежна плесен ( <i>Microdochium nivale</i> )				