

				черни листни петна (алтернариоза) ( <i>Alternaria</i> spp.) – внася се При поява на болестта Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 7-10 Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка				
			40 мл/дка	<b>Лозя</b> Брашнеста мана ( <i>Uncinula necator</i> )				
<b>240.</b>	<b>РОКСАМ 75 ВГ</b> Суми Агро България ЕООД	Второ търговско име на <b>ЕЛЕКТИС 75 ВГ</b>						
<b>241.</b>	<b>САВИАЛ ПОСТ</b> Лаинко С.А, Испания Разрешение № 01768-ПРЗ-1/15.11.2019 г. Заповед №РД11-2176/04.11.2019 г	732,8 г/л <a href="#">(еквивалентно на 250 г/л фосфонова киселина)</a>	700 – 1000 мл продукт/хл	<b>Ябълки, круши</b> Запарване на плодовете при съхранение – внася се след прибиране Омокряне на плодовете в продължение на 30 сек Брой мин/макс приложения - 1	3	-	втора професионална	със системно действие
			700 – 1000 мл продукт/хл	<b>Цитрусови култури (портокали, лимони, мандарини)</b> Гниене на плодовете при съхранение ( <i>Phytophthora</i> spp.) – внася се след прибиране Брой мин/макс приложения - 1 Омокряне на плодовете в продължение на 30 сек	3	-		
<b>242.</b>	<b>САВИАЛ ФОРТЕ</b> Лаинко, С.А., Испания Разрешение №01783-ПРЗ-2/30.06.2023 г. Заповед №РД11-2176 от 04.11.2019 г Заповед № РД11-1351/07.06.2023 г.	<a href="#">калиеви фосфонати</a> - 790 г/л (еквивалентно на 510 г/л фосфонова киселина)	250 мл продукт/дка	<b>Лозя (винени и десертни сортове)</b> Мана ( <i>Plasmopara viticola</i> ) – внася се след ВВСН 20 (9 и повече листа са отворени) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	15 дни	непрофесионална	със системно действие
			150-875мл продукт/дка	<b>Портокали, Грейпфрути</b> Срещу Фитофторно гниене ( <i>Phytophthora</i> sp.) – внася се след ВВСН 40 Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 20 Вода л/дка мин/макс – 100-350 л/дка	П	15 дни		
			45-250 мл продукт/ дка	<b>Домати</b> Срещу Картофена мана ( <i>Phytophthora infestans</i> ) – внася се във фаза ВВСН	О	15 дни		