

			200 г/дка	Домати Срещу Брашнеста мана (<i>Leveillula taurica</i>) внася се във фаза ВВСН 10-51 (пълно разтвара-ряне на котиле-доните-първо съцветие изправена пъпка, първа цветна пъпка) Брой мин/макс приложения – 6 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс - 50-100 л/дка		3 дни	
			400 гр/дка	Лозя Срещу Брашнеста мана (Оидиум), (<i>Uncinula necator</i>) първо приложение от ВВСН 15-18 (растежа продължава до петите листа са отворени до растежа продължава до осем и повече листа са отворени) Брой мин/макс приложения – 8 Интервал между приложенията – 7 дни Вода л/дка мин/макс - 50-100 л/дка		5 дни	
			750 г/ дка	Минимална употреба Цвекло Срещу Брашнеста мана (<i>Erysiphe communis, E.betae</i>) внася се във фаза ВВСН15-39 (разлистени 5 листа - листата покриват 90% от повърхността) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс - 20-50 л/дка		14 дни	
271.	СОЛОФЛ АДАМА Макгешим ЛТд, Израел Разрешение № 01399–ПРЗ-2/05.02.2018 г. Заповед №РД 11-689/22.04.2016 г. Заповед №РД 11-108/18.01.2018 г. Заповед №РД 11-2536/11.12.2018 г.	фолпет - 800 г/кг	188 г/дка	Лозя (винени сортове) Екскориоза (<i>Cryptosporella viticola</i>) - ВВСН 05-12 („мъхеста фаза“: ясно се вижда кафяв мъх- вторите листа са отворени) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между третиранията – 7 Вода л/дка мин/макс- 7 Мана по лозата (<i>Plasmopara viticola</i>) - ВВСН 12-83 (вторите листа са отворени - зърната формират цвят) Максимален брой третирания за сезон		Лозя (винени сортове) – 28; Лозя (десертни сортове) - 70	втора професионална

				– 7 , вкл. срещу екскориоза Брой мин/макс приложения – 7 Интервал между третиранията – 7 Вода л/дка мин/макс- 7				
			188 г/дка	Лозя (десертни сортове) Екскориоза (<i>Cryptosporella viticola</i>) - ВВСН 05-12 („мъхеста фаза“: ясно се вижда кафяв мъх - вторите листа са отворени) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между третиранията – 7 Вода л/дка мин/макс- 7 Мана по лозата (<i>Plasmopara viticola</i>) - ВВСН 12-69 (вторите листа са отворени - край на цъфтежа) Максимален брой третирания за сезон – 7 , вкл. срещу екскориоза Брой мин/макс приложения – 7 Интервал между третиранията – 7 Вода л/дка мин/макс - 7				
272.	СОЛФОЛИКИД 800 СК АФЕПАСА (Азуфрера и Фертилизантес Паларес)/Испания Разрешение № 01383–ПРЗ- 3/05.07.2021 г. Заповед № РД 11- 406/16.03.2016 г. Заповед № РД 11-84 от 12.01.2021 г. Заповед №РД 11-1284 от 18.06.2021 г.	сяра –800 г/л	400 мл/дка	Лозя Брашнеста мана (<i>Uncinula necator</i>) – внася се във фаза Първо третиране от ВВСН 15-18 (пет листа отворени - осем листа отворени) Брой мин/макс приложения – 8 Интервал между приложенията – 7 Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	5	непрофесионална	SPe8 - Да не се прилага при култури по време на цъфтеж с несистемно действие
			1210 мл/дка	Лозя Брашнеста мана (<i>Uncinula necator</i>) – внася се във фаза Първо третиране от ВВСН 15-18 (пет листа отворени - осем листа отворени) Брой мин/макс приложения – 8 Интервал между приложенията – 10 Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	5		
			1000 мл/дка	Пшеница Брашнеста мана (<i>Erysiphe/ Blumeria graminis</i>) – внася се при поява на симптоми Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията – 10- 14	П	35		