

			62,5 мл продукт/ дка	<b>Цитрусови култури</b> Срещу широколистни плевели и някои едногодишни житни плевели – внася се във фаза През цялата вегетация (от есента до рано напролет) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 20-50 л/дка Насочено пръскане в редовете или между редовете на културата, до 30% от площта и до максимум 62,5 мл продукт/дка	П	21 дни		
			62,5 мл продукт/ дка	<b>Маслини</b> Срещу широколистни плевели и някои едногодишни житни плевели - - внася се през цялата вегетация. Без опадали по земята маслини Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс - 20-50 л/дка Между редовете на културата или на площта на поливане, до 30% от площта и до максимум 62,5 мл продукт/дка	П	21 дни		
276.	<b>СПАНДИС</b> Синджента България ЕООД Разрешение № 01633- ПРЗ-3/29.10.2021 г. Заповед №РД 11- 2059/19.10.2018 г. Заповед №РД 11-52 от 06.01.2020 г. Заповед №РД 11-2194 от 28.09.2020 г. Заповед №РД 11-2376 от 13.10.2021 г.	<a href="#">просулфурон</a> - 40 г/кг  <a href="#">дикамба</a> - 400 г/кг  <a href="#">никосулфурон</a> – 100 г/кг	40-50 г продукт/дка	<b>Царевича</b> Срещу Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на 2-ри лист-разтваряне на 8-ми лист) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Да не се прилага при сладка царевича Да не се прилага повече от 1 път на 3 години на една и съща площ Към резервоарната смес да се добавя адювант на маслена основа	П	-	втора професионална	
277.	<b>СПЕКТРУМ</b> БАСФ ЕООД - България Удостоверение № 360- ПРЗ-1/26.04.2006 г Заповед № РД 09- 213/06.04.2006 г.	720 г/л <a href="#">диметенамид-П</a>	80-140 мл/дка	<b>Царевича, Слънчоглед, Захарно цвекло Соя, Каргофи</b> Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели - внася се след сеитба, преди поникване на културите		-	3	

278.	<b>СПРИНГБОК</b> БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01366– ПРЗ-2/ 08.01.2016 г. Заповед № РД 11- 1938/30.12.2015 г. Заповед №РД 11- 2605/01.12.2017 г.	<u>диметенамид – П</u> - 200 г/л <u>метазахлор</u> – 200 г/л	250 мл/дка	<b>Зимна маслодайна рапица</b> Срещу едногодишни житни и широколистни плевели, самосевки от житни култури - на една и съща площ еднократно третиране на 2 години. Еднократно приложение във фенофази ВВСН 00-09 (сухо семе – показване на котиледоните на почвената повърхност) или във фенофази ВВСН 10-18 (напълно оформени котиледони - 9 листа оформени)	П	70 дни	първа професионална	
279.	<b>СТАРАНЕ ГОЛД</b> Дау АгроСайънсис Експорт С.А.С., Франция Разрешение № 01294 – ПРЗ-1/19.03.2015 г. Заповед № РД 11- 265/13.02.2015 г.	<u>флуроксипир</u> – 100,0 г/л <u>флорасулам</u> – 1,0 г/л	180 мл/дка	<b>Овес (зимен и пролетен), зимна пшеница (мека и твърда), пролетна пшеница (мека и твърда), ечемик (зимен и пролетен), ръж (зимна и пролетна), тритикале</b> – Срещу широколистни плевели внася се във фаза ВВСН 13-45: 3 листа разтворени – късна фаза на вретенене-влагалището на флаговия лист е издуто. <b>Изключение:</b> при пролетна мека и твърда пшеница да се прилага при ВВСН 13-32: 3 листа разтворени – вторият възел е най-малко на 2 см. над първия възел		Овес (зимен и пролетен), зимна пшеница (мека и твърда), пролетна пшеница (мека и твърда), ечемик (зимен и пролетен), ръж (зимна и пролетна), тритикале - 50 дни; Царевича за зърно и силаж	втора професионална	
280.	<b>СТАРШИП/ КИДЕКА ПРО</b> Нюфарм ГмбХ&КоКГ, Австрия Разрешение № 02051- ПРЗ-2/03.04.2023 г. Заповед №РД11- 2384/01.11.2022 г.	<u>месотрион</u> – 100 г/л	150 мл/дка	<b>Царевича</b> Срещу широколистни и житни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-19 (сухо семе – разтваряне на девети (или следващ пореден) лист Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 8-40 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
			75 мл/дка	<b>Царевича</b> Срещу широколистни и житни плевели –				