

	Заповед №РД 11-1930 от 23.08.2021 г. Заповед №РД11-1028/04.05.2023 г. Заповед №РД11-2581/07.11.2023 г.							
300.	ТАРИКА Лаинко, С.А., Испания Разрешение № 01407 – ПРЗ-1/09.05.2016 г. Заповед №РД 11-610/19.04.2016 г. Заповед №РД 11-1058/19.06.2018 г. Заповед №РД11-530/09.03.2023	трибенурон-метил – 750 г/кг	2 г/дка	Пшеница, Ечемик, Тритикале, Овес, Ръж Едногодишни широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 13-39 през пролетта (3 листа разтворени до флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка Да не се прилага след ВВСН 39. Да не се използва продукта повече от веднъж на година на един парцел и повече от веднъж на култура.		-	непрофесионална	
301.	ТЕМЗА СК Глобахем Н.В, Белгия Разрешение № 01494 – ПРЗ-2/01.03.2018 г. Заповед №РД 11 – 1709/16.08.2017 г. Заповед №РД 11-336/23.02.2018 г.	мезотрион – 100 г/л	75 - 150 мл/дка	Царевича за фураж и зърно Едногодишни житни и широколистни плевели внася се във фаза ВВСН 12-19 (разтваряне на втори лист – разтваряне на девети лист) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 11-40 л/дка	П	-	втора професионална	
302.	ТЕМЗА 480 СК/ ОСОРНО 480 СК Глобахем Н.В, Белгия Разрешение № 02017-ПРЗ-2/18.10.2022 г. Заповед №РД 11-640 от 31.03.2022 г. Заповед №РД11-2152/30.09.2022 г.	месотрион – 480 г/л	30 мл/дка	Царевича за сърно и фураж Срещу едногодишни житни и широколистни плевели. Внася се преди поникване на културата ВВСН 00-08 (сухо семе - поява на колеоптила) или след поникване на културата ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист) Ранни фази от развитието на плевелите	П	-	втора професионална	Продуктът да не се прилага при сладка царевича и при царевича за семепроизводство.
303.	ТЕНДЪР ЕК Синджента България ЕООД	Второ търговско име на ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК						
304.	ТЕНУРОН 75 ВГ Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия	Второ търговско име на ТРИБЕ 75 ВГ						

318	ТРАКСОС 50 ЕК Синджента България ЕООД Разрешение № 01216-ПРЗ-2/ 09.08.2016 г. Заповед № РД 11- 1369/25.07.2016 г.	25 г/л пиноксаден 25 г/л клодинафоп пропаргил 6,25 г/л клоквинтоцет- мексил (антидот)	120 мл./дка	Пшеница Срещу едногодишни житни плевели (в т.ч. и див овес) - момент на приложение (фаза на приложение); от 3-ти лист до втори възел на културата (ВВСН 32), от фаза 3-ти лист до края на братене на дивия овес; фаза 3-5-ти лист на останалите житни плевели	-	втора професионална
319	ТРЕЙЛЪР Индъстриас Афраза С. А., Испания Разрешение № 01408 – ПРЗ-1/09.05.2016г. Заповед №РД 11-609/19.04.2016 г Заповед №РД 11-1061/19.06.2018 г.	трибенурон-метил – 750 г/кг	2 г/дка	Пшеница, Ечемик, Тритикале, Овес, Ръж Срещу Едногодишни широколистни плевели - внася се във фаза ВВСН 13-39 през пролетта (3 листа разтворени до флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка * Да не се прилага след ВВСН 39. Да не се използва продукта повече от веднъж на година на един парцел и повече от веднъж на култура.	-	непрофесионална
320	ТРИБЕ 75 ВГ/ТЕНУРОН 75 ВГ/ТРИНУ 75 ВГ /ТРИРОН 75 ВГ/ТРИША 75 ВГ Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия Разрешение №01307– ПРЗ-4/04.05.2017 г. Заповед № РД 11-414/10.03.2015 г., Заповед №РД 11-183/03.02.2016 г., Заповед №РД 11-2402/05.12.2016 г.и Заповед №РД 11-831/24.04.2017 г. Заповед №РД 11-1749/29.08.2018 г.	трибенурон–метил - 750 г/кг	2 г/дка	Пшеница, Ечемик (пролетен и зимен), Овес (пролетен и зимен), Ръж, Тритикале Срещу едногодишни широколистни плевели ВВСН 12 – 39 (разтворени два листа – флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Да не се прилага след фаза ВВСН 39 на културата. Да не се прилага преди края на февруари в годината на реколти-ране.	-	втора професионална

321.	ТРИМЕР СХ Адама Агрикулчър БВ, Нидерландия Разрешение № 01703- ПРЗ-1/22.04.2019 г. Заповед №РД 11- 718/11.04.2019 г.	трибенурон (трибенурон- метил) – 500 г/кг	1.5-3.7 г/дка	Пшеница (мека и твърда), ечемик, овес, Тритикале Срещу едногодишни широколистни плевели във фаза ВВСН 21-39 (начало на братене: видим първи брат – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	втора професионална	
322.	ТРИНУ 75 ВГ Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия.	Второ търговско име на ТРИБЕ 75 ВГ						
323.	ТРИМЕР 75 ДФ Хеминова България и Румъния ЕООД	Второ търговско име на ГРАНСТАР 75 ДФ						
324.	ТРИМУР Ексклузивас Сарабия, С.А Разрешение № 01386– ПРЗ-1/ 25.03.2016г. Заповед № РД 11- 396/16.03.2016 г. Заповед № РД 11- 1057/19.06.2018 г.	трибенурон-метил 750 г/кг	1- 2 г/дка	Пшеница, Ечемик Срещу едногодишни широколистни плевели - Внася се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени до край на братенето) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-33 л/дка Да не се прилага след ВВСН 29		-	непрофесионална а	
325.	ТРИПАЛИ ВГ ФМС Агро България ЕООД Разрешение № 01504– ПРЗ-2/12.03.2018 г. Заповед № РД 11- 2040/17.10.2017 г. Заповед № РД 11- 380/01.03.2018 г. Заповед №РД 11- 2538/11.12.2018 г. Заповед №РД 11-1937 от 24.08.2021 г.	трибенурон-метил 83 г/кг метсулфурон- метил 83 г/кг флорасулам 105 г/кг	3,5-5 г/дка	Житни култури (пшеница, ечемик, овес, ръж) Едногодишни и многогодишни широколистни плевели - внася във фаза ВВСН 20 – 39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) Брой приложения мин/макс - 1 Вода л/дка мин/макс - 10 – 40 Да не се прилага през есента	П	-	втора професионална	