

				Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка Да не се консумира-рат листа от лози, третира-ни с продукта				динатриеви фосфонати и други, водещи до образуване на фосфонова киселина, да се ограничи до общо 10 кг еквивалент на фосфонова киселина/хектар за година
313.	ФЛУАЗИНОВА Финкимика С.п.А., Италия Разрешение № 02055-ПРЗ- 1/16.11.2022 г. Заповед №РД11- 2389/02.11.2022 г.	флуазинам – 500 г/л	100 мл/дка	Лозя (винени сортове) Срещу Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>) – внося се във фаза ВВСН 69-85 (край на цъфтежа-омекване на зърната) Брой мин/макс приложения – 3 Интервал между приложенията – 6 Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка	П	21	втора професионална	с несистемно действие
			40 мл/дка	Картофи Срещу Мана (<i>Phytophthora infestans</i>) – внося се във фаза ВВСН 26-85 (поява на шесто основно странично разклонение (> 5 см)-плодовете от първо плодобразуване са оцветени от охра до кафяво) Брой мин/макс приложения – 8 Интервал между приложенията – 6 Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка	П	7		
314.	ФОЛИКУР 250 ЕВ /ХОРИЗОНТ Байер България ЕООД Разрешение № 0552-3/ 26.01.2016 г. Заповед №РД 11- 47/13.01.2016 г.	250 г/л тебуконазол	0,04 % (40 мл/дка)	Лоза Оидиум по лоза (<i>Oidium tuckeri</i>);		Лоза -21 дни; Рапица -56 дни	втора професионална	
			50-100мл/дка 100мл/дка	Рапица Фома по маслодайна рапица (<i>Phoma lingam</i>); Склеротиния по маслодайна рапица (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>);				
315.	ФОЛОУ 80 ВГ/ ФРИЛЪР 80 ВГ/ ФЛОУЕТ 80 ВГ ШАРДА ЕВРОПА б.в.б.а., Белгия Разрешение № 01295-4/30.05.2022	фолпет – 800 г/кг	187,5 г/дка	Лозя (винени сортове) Мана (<i>Plasmopara viticola</i>), Сиво гниене (<i>Botrytis cinerea</i>), Екскориоза (<i>Phomopsis viticola</i>), Черно гниене(<i>Guignardia bidwellii</i>), Бяло гниене (<i>Coniella diplodiella</i>) – внося се	П	28 дни	втора професионална	с несистемно действие

				Вода л/дка минмакс – 60-150 л/дка *0,045% -0,05% със 100 л/дка работен разтвор При спазване забраната за употреба по време на цъфтеж, съгласно Закона за пчеларството			
329.	ХОРИЗОНТ Байер България ЕООД				Второ търговско име на ФОЛИКУР 250 ЕВ		
330.	МАКСИМ ЕКСТРА (ЦЕЛЕСТ ЕКСТРА 050 ФС) Синджента България ЕООД Разрешение № 01342 – ПРЗ-2/20.12.2021 г. Заповед №РД 11-1648/06.11.2015 г. Заповед №РД 11-1444/25.07.2019 г. Заповед №РД 11-2953 от 09.12.2021 г.	флудиоксонил - 25 г/л дифеноконазол - 25 г/л	150- 200 мл /100 кг семена 200 мл /100 кг семена	Пшеница Хелминтоспориоза (<i>Cochliobolus sativus</i>); Фузариоза (<i>Fusarium</i> spp.); Петносване на плевите (<i>Leptosphaeria nodorum</i>); Твърда (мазна,миризлива) главня (<i>Tilletia caries</i>); Вджуджаваща главня (<i>Tilletia controversa</i>) Снежна плесен (<i>Monographella nivalis</i>); Праховита главня (<i>Ustilago tritici</i>) внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения - 1	3	-	втора професионална
			150- 200 мл / 100 кг семена 200 мл /100 кг семена	Ечемик Хелминтоспориоза (<i>Helminthosporium</i> spp., <i>Cochliobolus sativus</i>); Фузариоза (<i>Fusarium</i> spp.); Ленточна болест (<i>Pyrenophora graminea</i> = <i>Helminthosporium gramineum</i>) Снежна плесен (<i>Monographella nivalis</i>); Мрежести петна (<i>Pyrenophora teres</i>); Покрита главня (<i>Ustilago hordei</i>) внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Брой мин/макс приложения - 1			
			150- 200 мл / 100 кг семена 200 мл /100 кг семена	Овес Фузариоза (<i>Fusarium</i> spp.); Червени петна (<i>Pyrenophora avenae</i>) внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе) Хелминтоспориоза (<i>Cochliobolus sativus</i>); Листни петна и петносване на плевите (<i>Septoria</i> spp.); Праховита главня (<i>Ustilago avenae</i>) внася се във			