

	Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл, Белгия							
166.	ЦИПЕРТ 500 ЕК Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл, Белгия	Второ търговско име на ЦИТРИН МАКС						
167.	ЦИТРИН МАКС /ЦИПЕРКИЛ 500 ЕК /ЦИПЕРТ 500 ЕК /ПОЛИ 500 ЕК Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл, Белгия Удостоверение № № 01176-ПРЗ- 2/20.03.2014 г. Заповед № РД 11- 178/18.02.2013 г. Заповед № РД 11- 304/10.03.2014 г. Заповед №РД 11-348 от 02.03.2022 г. Заповед №РД 11- 1014/04.05.2023	500 г/л циперметрин	5 мл/дка	<p>Житни -Листни въшки по житни (<i>Sitobion avenae</i>), житни листозавивачки (<i>Cnephasia spp</i>) и Листни въшки (<i>Metopolophium dirhodum</i>);</p> <p>Рапица Рапична стъблена бълха (<i>Psylloides chrysocephala</i>), Рапичен скритохоботник (<i>Ceuthorrhynchus assimilis</i>), Рапичен цветояд (<i>Meligeyhes aeneus</i>), Рапична листна оса (<i>Anthalia rosae</i>), Рапичен стъблен скритохоботник (<i>Ceuthorrhynchus napi</i>) и зелен стъблен скритохоботник (<i>Ceuthorrhynchus quadridens</i>);</p> <p>Лен Синя ленова бълха (<i>Aphthona euphorbiae</i>), Ленова бълха (<i>Longitarsus parvulus</i>) и Крыгломиниращ молец (<i>Leucoptera malifoliella</i>);</p> <p>Лозя Филоксера (<i>Phylloxera vastatrix</i>);</p> <p>Зеле Бяла зелева пеперуда (<i>Pieris brassicae</i>)</p> <p>Фасул Листни въшки (<i>Aphididae spp.</i>)</p> <p>Леща Грахова листозавивачка (<i>Cydia nigricana</i>) и зърнояди (<i>Bruchinae</i>) Листни въшки (<i>Aphididae spp.</i>)</p> <p>Грах Хоботници (<i>Curculionidae</i>), Листни въшки (<i>Aphididae spp.</i>), Грахова листозавивачка (<i>Cydia nigricana</i>), Зърнояди (<i>Bruchinae</i>) и Гамозначна ношенка (<i>Autographa gamma</i>)</p> <p>Пролетен грах Грахова листозавивачка (<i>Cydia nigricana</i>), Хоботници (<i>Curculionidae</i>) и листни въшки;</p> <p>Бакла Листни въшки (<i>Aphididae spp.</i>), Зърнояди (<i>Bruchinae</i>) и Хоботници (<i>Curculionidae</i>);</p> <p>Лук и чесън Трипс (<i>Thrips tabaci</i>)</p> <p>Праз Молец по празу (<i>Acrolepia assectella</i>), Трипс (<i>Thrips tabaci</i>)</p> <p>Картофи Колорадски бръмбар (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)</p> <p>Ряпа Репна пеперуда (<i>Pieris rapae</i>)</p>	-	3-домати; 7-зеле картофи, праз, лук и чесън; 14-грах и бакла; 21-грозде; 28-зърнено- житни; 49-рапица и лен; царевича – не се изисква	2	SPe8 - Опасен за пчели
			6 мл/дка	<p>Лозя Лозова цикада (<i>Empoasca vitis</i>), Еднопоясен гроздов молец (<i>Eupoecilia ambiguella</i>), Шарен гроздов молец (<i>Lobesia botrana</i>) и Малка лозова листозавивачка (<i>Argyrotaenia pulchellana</i>);</p>				
			10 мл/дка	<p>Домати Гамукова ношенка (<i>Heliothis armigera</i>), Картофен молец (<i>Phthorimaea operculella</i>), Бели пеперуди (<i>Pieris spp.</i>), Зелени молци (<i>Plutella spp.</i>), Зелени ношенки (<i>Mamestra spp.</i>), Гамозначна ношенка (<i>Autographa gamma</i>) и Зимен сив червей (<i>Agrotis segetum</i>);</p>				
			10 мл/дка	<p>Декоративни рози Листни въшки</p>				
			15 мл/дка	<p>Царевича Царевичен стъблен пробивач (<i>Ostrinia nubilalis</i>) и <i>Sesamia nonagrioides</i></p>				

168.	ШЕРПА 100 ЕВ /АФИКАР 100 /ЦИПЕРФОР 100 ЕВ /ЦИКЛОН 100 ЕВ СБМ Девелопмънт, Франция Разрешение № 01347– ПРЗ-2/ 08.01.2016 г. Заповед №РД 11-1650/ 06.11.2015г Заповед № РД 11- 1941/30.12.2015 г. Заповед № РД 11- 699/19.04.2018 г. Заповед №РД 11- 2379/22.11.2018 г. Заповед №РД 11-624 от 05.03.2020 г. Заповед №РД 11-1599 от 12.07.2021 г.	циперметрин - 100 г/л	25 мл/дка	Пшеница, ръж, тритикале Листни въшки по класа (<i>Sitobion avenae</i>) – внася се във фаза ВВСН 10 – 69 (Първи лист от колеоптила – края на цъфтеж) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс - 21 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л /дка		Пшеница, ръж, тритикале – 21 дни; Рапица – 28 дни; Ябълкаи, круши, Картофи – 14 дни; Царевича, сладка царевича, сорго, грах, рапица, пшеница, ръж, тритикале, овес, ечемик, слънчоглед, лозя – 7 дни;	втора професионална	SPe8-Опасен за пчелите
			20 мл/дка	Пшеница, ръж, тритикале Листни въшки по листата (<i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Metopolophium dirhodum</i>) – внася се във фаза ВВСН 12 – 29 (Втории лист - край на братенето) Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс - 21 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л /дка				
			15 мл/дка	Рапица Рапичен цветояд (<i>Meligethes aeneus</i>) – внася се При поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс - 21 Вода л/дка мин/макс – 30-50 л /дка				
			25 мл/дка	Рапица Рапична стъблена бълха (<i>Psylliodes chrysocephala</i>) – внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс - 21 Вода л/дка мин/макс – 30-50 л /дка				
			25 мл/дка	Рапица Рапичен скритохоботник (<i>Ceutorhynchus assimilis</i>) внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс - 21 Вода л/дка мин/макс – 30-50 л /дка				
			20 мл/дка	Картофи Колорадски бръмбар (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)- внася се ВВСН 09 – 6N9* (Поникване – края на цъфтеж) при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията мин/макс - 21 Вода л/дка мин/макс – 50-100 л /дка				
			30 мл/дка	Ябълки Листоминиращи молци (<i>Stigmella malella</i> , <i>Lyonetia clerkella</i>) внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100 л /дка				
			30 мл/дка	Ябълкаи, Круши Ябълков плодов червей (<i>Cydia pomonella</i>)- внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 100 л /дка				
			30 мл/дка 25 мл/дка	Лозя: Цикада (<i>Scaphoides titanus</i>), вектор на “Златисто пожълтяване на лозата Еднопоясен и шарен гроздов молец (<i>Eupoecilia ambiguella</i> , <i>Lobesia botrana</i>) Внася се при поява на неприятеля Брой мин/макс приложения – 2 Интервал между приложенията - 21 Вода л/дка мин/макс – 30-100 л /дка				