

191	МОДАОН 4 Ф Адама Агрикълчър БВ, Нидерландия Разрешение №176-ПРЗ-3/17.03.2021 г. Заповед №РД 09-869/19.12.2003 г. Заповед № РД 11-836/05.08.2013г. Заповед № РД 11-458 от 05.03.2021 г.	480 г/л бифенокс	150 мл/дка	Слънчоглед Срещу Обикновен щир (<i>Amaranthus retroflexus</i>), Бяла куча лобода (<i>Cheopodium album</i>) – приложение след сеитба преди поникване или по време на вегетацията при 3-5 лист на културата Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	П	-	втора професионална	със системно действие
			100 мл/дка	Маслодайна рапица Срещу Полски синап (<i>Sinapis arvensis</i>) – внася се във фаза ВВСН 14-18 (Фаза 4-8 листа на културата) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка				
			150 мл продукт/ дка	Зимна пшеница, зимен ечемик, зимна твърда пшеница, тритикале, зимен овес, зимна ръж. Пролетна пшеница, пролетен ечемик, пролетна твърда пшеница, пролетен овес Срещу едногодишни широколистни плевели, след поникване – внася се във фаза ВВСН 12-32 (2 листа разтворени-вторият възел е най-малко на 2 см над първият възел) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка				
192	МОНСУН АКТИВ ОД Байер България ЕООД Удостоверение № 01255–ПРЗ-2/16.06.2015г. Заповед №РД 11-1058/03.07.2014 г. Заповед №РД 11-765/29.04.2015 г.	31,5 г/л форамсулфурон - натрий 10 г/л тиенкарбазон-метил 15 г/л ципросулфамид (антидот)		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:		-	1	
			150 мл/дка	Царевина Приложение разтваряне на втори-осми лист (ВВСН 12-18)				
			75 мл/дка	Царевина брой приложения -2 1) втори лист-трети лист (ВВСН 12-13); 2)пети-осми лист (ВВСН 15-18)				
			200 мл/дка	Царевина Срещу балур от коренища (<i>Sorghum halepense</i>)Приложение - разтваряне на втори- осми лист (ВВСН 12-18)				
193	МОНТАНА СУПРА	Глифозат – 450 г/л	240 мл/дка	Всички култури, които се сеят и разсаждат, с изключение на горски	П	-	втора професионална	тотален хербицид със

АСЦЕНЗА АГРО С.А., Португалия Разрешение № 02121- ПРЗ-1/04.04.2024 г. Заповед № РД11- 777/28.03.2024 г.			видове Едногодишни житни плевели по пролетни култури - Преди сеитба/ Преди засаждане (активно растящи плевели) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка			системно действие
	320-400 мл/дка	Всички култури, които се сеят и разсаждат, с изключение на горски видове Едногодишни житни плевели по зимни култури - Преди сеитба/ Преди засаждане (активно растящи плевели) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка	П	-		
	400-480 мл/дка	Всички култури, които се сеят и разсаждат, с изключение на горски видове Едногодишни и двугодишни широколистни плевели и многогодишни плевели по пролетни и зимни култури Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-20 л/дка	П	-		
	480 мл/дка	Пшеница (мека и твърда), тритикале, овес и ръж (преди сеитба на зърнено-житни култури и за стърнища, житни култури с изключение на производство на семена) Многогодишни плевели - След прибиране на реколтата/Преди сеитба (ранни стадии на развитие на плевелите) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка Да не се използват за фураж при животните продуктите и страничните продукти от пшеница. Да не се употребява при фаза на развитие ВВСН 71-89 при зърнено-житни култури преди сеитба.	П	-		
	320-480 мл/дка	Костилкови овощни видове (праскова, кайсия, череша, слива), Черупкови овощни видове (бадем, лешник, кестен, орех), Семкови овощни видове	П	Черупкови и семкови овощни		

				(ябълка, круша, дюля, японска мушмула), Цитрусови култури (портокал, лимон, мандарина, горчив портокал, клементина), Маслини Едногодишни житни плевели - до ВВСН 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка		видове: 28 дни; Неприложимо за цитруси и костилкови овощни видове; Маслин: 21 дни.		
			240-480 мл/дка	Костилкови овощни видове (праскова, кайсия, череша, слива), Черупкови овощни видове (бадем, лешник, кестен, орех), Семкови овощни видове (ябълка, круша, дюля, японска мушмула), Цитрусови култури (портокал, лимон, мандарина, горчив портокал, клементина), Маслини Едногодишни и двугодишни широколистни плевели - до ВВСН 69 (край на цъфтежа) След поникване на плевелите (активно растящи плевели с 10 - 20 см височина на плевелите) Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка	П			
194	МУСТАНГ 306,25 СК ДАУ Агросайънсис - САЩ Удостоверение № 156/05.01.2005 г. Протокол № 43 от 1998 г. на МЗГ	6,25 г/л флорасулам+ 300 г/л 2,4 Д естер		Срещу широколистни в т.ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:		65 дни	3	
			40 мл/дка или 60 мл/дка	Царевича Внася се във фаза 3-5 лист на културата. При наличие на паламида се използва високата доза (60 мл/дка)				
			60-80 мл/дка	Пшеница Внася се във фаза братене на културата				
195	МУСТАНГ ФОРТЕ СЕ Кортева Агрисайънс България ЕООД Разрешение № 01940-ПРЗ-1/05.05.2021 г. Заповед №РД 11-797 от 22.04.2021 г.	2,4-Д (като 2,4-Д етил хексил) - 180 г/л (киселинен еквивалент) аминопиралид (като аминопиралид	50 мл продукт/дка	Твърда и мека пшеница, ечемик, тритикале, ръж, спелта Срещу широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 21-32 (начало на братене: видим първи брат - вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел) Брой мин/макс приложения – 1	П	-	втора професионална	със системно действие